

## การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายมาที่ตับ (ตอนที่ 1)

บุญญา ศิริจินดาภุล\*  
ศุภฤกษ์ ปรีชาอุทธ\*\*

**Sirichindakul B, Prichayudh S. Surgery in Colorectal liver metastasis (part I). Chula Med J 2002 Dec; 46(12): 1003 - 14**

*Liver metastasis is the most common liver tumor. The most popular primary site which has been explored is colorectal cancer. Nearly half of the colorectal cancer patients will have liver metastasis until death.*

*At present, surgical resection-liver resection is the effective intervention which provides long term survival to the patients. We summarized the roles of liver resection in colorectal liver metastasis and factors which determine survival and recurrence.*

*In this review, we mention how to manage colorectal liver metastasis by liver resection in terms of isolated tumor, combined liver metastasis with other organs and recurrent liver metastasis.*

**Keywords** : Colorectal cancer, Liver metastasis, Surgery, Liver resection.

Reprint request : Sirichindakul B, Department of Surgery, Faculty of Medicine,

Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

Received for publication. September 15, 2002.

**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติการดำเนินโรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายมาที่ตับ  
เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายมาที่ตับด้วยวิธี  
การผ่าตัด

\* ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\*\* แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาเหตุการตายที่สำคัญของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ในญี่เกิดจากการแพร่กระจายของเนื้องอก (systemic metastasis) ซึ่งพบที่ตับได้ถึงร้อยละ 33-50<sup>(1,2)</sup> อย่างไรก็ตามมะเร็งลำไส้ในญี่ที่แพร่กระจายมาที่ตับ (colorectal liver metastasis: CRLM) มีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆ การผ่าตัดโดยการเอาเนื้องอกออก เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตยืนยาวได้

### Natural History of Colorectal Liver Metastasis

ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ในญี่ที่มีการแพร่กระจายมาที่ตับและไม่ได้รับการรักษา มีอัตราการรอดชีวิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 -10 เดือน<sup>(1,3)</sup> และส่วนน้อยที่จะมีชีวิตอยู่รอดถึง 5 ปี<sup>(1-5)</sup>

Stangl R, et al.<sup>(4)</sup> ทำการศึกษาผู้ป่วย CRLM ทั้งหมด 1099 รายพบว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา 484 ราย (โดยคัดผู้ป่วยจำนวน 82 รายที่มี second primary tumor หรือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดออก) มีอัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ย เท่ากับ 7.5 เดือน (โดยมีอัตราการอยู่รอดที่ 1 ปี 31.3 %, 2 ปี 7.9 %, 3 ปี 2.6 % และ 5 ปี 0.9 %) ในกลุ่มที่ได้รับ regional chemotherapy 123 ราย มีอัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 12.7 เดือน และกลุ่มที่ได้รับ systemic chemotherapy 70 ราย มีอัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ย เท่ากับ 11.1 เดือน ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัด ตัดตับออก 340 ราย พบร่วมมีอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี ถึง 32 % โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่สามารถตัดเอาเนื้องอกออกได้หมด จะมีอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี ถึง 41 % และมีอัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ย 30 ถึง 41 เดือน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Wilson, et al<sup>(1)</sup> ที่พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกที่ตับออกมีอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 28 % ขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาไม่มีผู้ป่วยคนใดมีชีวิตยืนยาว

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการผ่าตัดนั้นเป็นการรักษา CRLM ที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวได้<sup>(1-5)</sup> อย่างไรก็ต้องในการผ่าตัดเนื้องอกออกได้ภายหลังจากการวินิจฉัย CRLM อุยุที่ประมาณ 25 %<sup>(6)</sup>

### Surgery in Colorectal Liver Metastasis

#### Isolated liver metastasis

##### 1. Timing of liver resection

###### 1.1 metachronous metastasis

การผ่าตัดในเนื้องอกชนิดนี้สามารถทำการผ่าตัดได้เลย หลังจากที่ผู้ป่วยผ่านการประเมินก่อนการผ่าตัดแล้วว่าไม่มีข้อห้ามต่างๆ ในการผ่าตัด ในการที่ผู้ป่วยมีข้อห้ามในการผ่าตัด เช่น เป็นเนื้องอกที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ควรได้รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ ก่อนที่จะพิจารณาผ่าตัด เช่น การให้เคมีบำบัด<sup>(3,7)</sup>

###### 1.2 Synchronous metastasis

พบประมาณร้อยละ 10-25 การผ่าตัดเนื้องอกชนิดนี้ยังเป็นที่ถูกเตียงกันถึงระยะเวลาในการผ่าตัด คือศัลยแพทย์บางกลุ่มแนะนำให้ทำการผ่าตัด ตัดตับพร้อมกับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ในญี่โดยใช้เหตุผลว่าการแพร่กระจายของมะเร็งลำไส้ในญี่จะแพร่กระจายผ่านทางเส้นเลือด (hematogenous metastasis) เป็นลำดับขั้นคือระยะไปที่ตับก่อน และระยะไปที่ปอดเป็นอันดับที่ 2 จากนั้นจึงกระจายไปที่อื่นๆ (cascade theory) และพบว่า synchronous metastasis จะมีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่า metachronous metastasis (ทั้งนี้อาจเป็นเพาะเนื้องอกมีความลุก浪บ่อน้ำมาก) และมีการศึกษาที่พบว่าการผ่าตัดตัดมะเร็งลำไส้ในญี่พร้อมกับการตัดตับนั้นสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยมีภาวะแทรกซ้อน, อัตราตายและการอยู่รอดไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ทำ stage operation (ตารางที่ 1) จึงแนะนำว่าให้ทำการผ่าตัดตัดเนื้องอกพร้อมกันใน synchronous metastasis<sup>(8)</sup>

ศัลยแพทย์บางกลุ่มแนะนำให้รอเวลาการผ่าตัดตัดตับออกไปหลังจากการผ่าตัด มะเร็งลำไส้ในญี่ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้<sup>(9)</sup>

1. การตรวจพบ CRLM ขณะที่ทำการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ในญี่เป็นการตรวจโดยบังเอิญ และส่วนใหญ่ของผู้ป่วยยังไม่ได้รับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ที่จะยืนยันว่าไม่มีเนื้องอกที่ตับในตำแหน่งอื่นๆ อีก

2. พับผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังไม่ได้ทำการตรวจ

ตารางที่ 1. The Results of combined colon and hepatic resection and comparison to isolated hepatic resection.

	Combined colon and hepatic resection group	Isolated hepatic Resection group	P value
No. of procedures	26	86	
Morbidity (%)	27	35	0.65*
Mean blood loss (units $\pm$ SE)	2.8 $\pm$ 1.2	2.2 $\pm$ 0.4	0.59**
Mean ICU stay (days $\pm$ SE)	2.1 $\pm$ 1.2	1.4 $\pm$ 0.4	0.48**
Mean LOS (days $\pm$ SE)	18.1 $\pm$ 2.6	14.2 $\pm$ 0.9	0.074**
Perioperative mortality (%)	0	2.3	1.0*
Median survival (months)	21	33	
5-year survival (%)	28.4	27.3	0.21***

\* Fisher exact test.

\*\* Unpaired t-test.

\*\*\* Logrank test.

เพิ่มเติมอย่างครบถ้วนที่จะยืนยันว่าไม่มีการแพร่กระจายของโรค (extraabdominal metastatic disease)

3. มีการศึกษาที่พบว่าการทำการผ่าตัดตัดตับ จะเพิ่มภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้

Bolton, et al.<sup>(9)</sup> ทำการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มี complex CRLM (ผู้ป่วยมีเนื้องอกมากกว่าหือเท่ากับ 4 ในตับกลีบเดียว กันหรือมีเนื้องอก 2 ข้างของตับ) ที่ทำการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่พร้อมกับการผ่าตัดตัดตับ จะมีภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดที่สูง (Blie leak 8.2 %, delayed hepatic function 13.6 %, colon anastomotic leak และ sepsis) และมีอัตราตาย สูงถึง 17 % (6/36) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทำการ stage operation 1 % (1/88) จึงแนะนำว่าในผู้ป่วยที่มี complex CRLM ควรขอประมาณ 3-6 เดือนหลังการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ระหว่างที่รอผ่าตัดพิจารณาให้ systemic chemotherapy ก่อน และตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาว่ามีการแพร่กระจายไปที่อื่น ๆ ของร่างกายอีกหรือไม่ ก่อนจะทำการผ่าตัดตัดตับออก


4. หลักการของ "Test of time" คือการรอเวลา

เพื่อให้ก้อนเนื้องอกขนาดเล็กที่ยังตรวจไม่พบ (subclinical metastasis) ปรากฏขึ้น เพื่อจะได้ทำการผ่าตัดเฉพาะเนื้องอกออกได้หมด

Scheele, et al.<sup>(7)</sup> แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องรอเวลา ก่อนผ่าตัดในรายที่มีก้อนเนื้องอกที่ตับขนาดมากกว่าหือเท่ากับ 4 ซม. แล้ว เนื่องจากเชื่อว่าเนื้องอกเหล่านี้ได้ผ่านการพิสูจน์ของเวลาแล้วว่าไม่คุณมี subclinical metastasis ที่ยังไม่ปรากฏขึ้นหลังเหลืออยู่อีก แต่แนะนำให้รอเวลาเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือที่มี ความไวสูงขึ้น เพื่อหา subclinical metastasis ในรายที่ก้อนเนื้องอกที่ตับมีขนาดเล็กและมีหลายก้อน ตั้งแต่ครึ่งแรกที่ตัวพับ

โดยสรุปแล้ว Scheele, et al.<sup>(7)</sup> แนะนำว่าสามารถทำการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และตัดตับพร้อมกันได้ในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ข้างขวา (โดยไม่ขึ้นกับปริมาณตับที่ตัด) หรือการผ่าตัดที่ตับนั้นตัดตับไม่มากกว่า 2 Couinaud segments (โดยไม่ขึ้นกับการผ่าตัดที่ลำไส้ใหญ่) และแนะนำให้ทำการ stage operation ในรายที่ทำการผ่าตัดเนื้องอกของลำไส้ใหญ่ข้างซ้าย ร่วมกับการผ่าตัดตัดตับกลีบขวาออกหรือมากกว่า

- A) Right lobectomy ;  
 B) Left lobectomy ;  
 C) Right trisegmentectomy ;  
 D) Left lateral segmentectomy ;  
 and  
 E) Left trisegmentectomy.



**รูปที่ 1.** Common liver resection for metastatic colorectal cancer.

## 2. Extent of liver resection (Anatomical VS. Nonanatomical resection)

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคมากที่สุดคือ การที่ไม่สามารถตัดเนื้องอกที่ตับออกหมดได้ ดังนั้นศัลยแพทย์บางกลุ่มจึงนิยมทำ anatomical resection ของตับ เพื่อบ้องกันการเกิด positive margin (รูปที่ 1)<sup>(7)</sup>


แต่จากความรู้ที่ว่า CRLM มักมีการกระจายจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านมาที่ตับทาง portal vein และมักไม่มีการกระจายของเนื้องอกไปยังตับส่วนอื่นจากตัว CRLM เอง (ซึ่งต่างจาก Hepatocellular carcinoma ที่มีการกระจายของเนื้องอกไปยังตับส่วนอื่นผ่านทาง portal flow) จึงมีแนวความคิดที่ว่า การทำ anatomical resection ไม่น่าจะมีข้อดีกว่าการทำ limited nonanatomical resection<sup>(10)</sup>

Yamamoto, et al.<sup>(11)</sup> ทำการศึกษาทางพยาธิในผู้ป่วย CRLM จำนวน 40 ราย (89 เนื้องอก) พบว่ามีลักษณะ satellite lesion เล็กรอบ ๆ เนื้องอก (ลักษณะที่บ่งชี้ให้เห็นว่ามีการกระจายของเนื้องอก ออกจากตัว CRLM เอง) น้อยมากเพียง 1 ใน 40 ราย และพบว่าการมี vascular invasion ในเนื้องอกที่มีจำนวนหลายก้อนไม่ได้มากกว่าในรายที่มีเนื้องอกเพียงก้อนเดียว จึงได้สนับสนุนการผ่าตัด limited nonanatomical resection และจากการที่ไม่พบ

microscopic satellite foci รอบ ๆ CRLM ในระยะ 10 mm. จึงให้ความเห็นว่า resection margin ไม่จำเป็นต้องมากกว่า 10 mm. ดังเช่นการศึกษาอื่น อย่างไรก็ตามการศึกษานี้พบว่ามีอุบัติการณ์ของการลุกลามเข้า glisson's capsule สูงขึ้นในรายที่เนื้องอกอยู่ใกล้ portal vein (ซึ่งตรวจพบได้ในขณะผ่าตัดจากการหนาตัวของ glisson's capsule โดยการส่องเกตด้วยตาเปล่า หรือใช้ Intraoperative Ultrasonography-Ious) จึงได้แนะนำการทำ anatomical resection ในผู้ป่วยกลุ่มนี้

Kokudo, et al.<sup>(12)</sup> ได้ทำการศึกษาเบริญเทียน anatomical major resection (96 ราย) และ nonanatomical limited resection (78 ราย) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง อัตราการอยู่รอด (อัตราการอยู่รอดที่ 5 ปีทั้งหมด 43.2 %) แต่พบว่าในกลุ่มที่ทำ anatomical resection นั้นมี ภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายที่มากกว่า (รูปที่ 2, ตารางที่ 2) เมื่อทำการวิเคราะห์ในกลุ่มที่มีเนื้องอก 1 หรือ 2 ก้อนในตับกลับเดียวกัน พบว่าในกลุ่ม nonanatomical จะมีเนื้องอกกลับมาเป็นข้าวในกลับเดียวกันที่สูงกว่ากลุ่ม anatomical (19.4 % VS 7.8 %) แต่ 90 % ของเนื้องอกกลับมาเป็นข้าวในกลับเดียวกันใน nonanatomical group สามารถทำผ่าตัดตับครั้งที่ 2 ได้และมีอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 60 % และจากเหตุผลที่ว่าการทำ anatomical resection ไม่ได้บ้องกันการเกิดเนื้องอกกลับมาเป็นข้าวในตับกลับตรงข้ามหรือแพร่กระจายของมะเร็งไปสู่ที่อื่น ซึ่งพบเป็นส่วนมากในผู้ป่วย (40 %) จึงได้แนะนำการทำ nonanatomical resection เป็นการผ่าตัดสำหรับ CRLM เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการผ่าตัด

โดยสรุปแล้วควรทำ limited nonanatomical resection เป็นหลักในรายที่สามารถทำผ่าตัดได้ และเลือกทำ anatomical resection ในรายที่ก้อนเนื้องอกอยู่ใกล้ major intrahepatic vascular structure หรือรายที่มีเนื้องอกขนาดเล็กหลายก้อนอยู่ในตับกลับเดียวกัน (รูปที่ 3) ซึ่งในรายที่ต้องตัดเนื้อตับมากกว่า 65 % แนะนำให้ทำ portal vein embolization ก่อนการผ่าตัดเพื่อลดปัญหาตับวายหลังการผ่าตัด<sup>(10)</sup>



รูปที่ 2. Kaplan-Meier estimates of overall survival after hepatic resection for metastatic colorectal cancer according to surgical procedures. There was no significant difference in patient survival between anatomical (solid line, n = 96) and nonanatomical (dashed line, n = 78) group.

ตารางที่ 2. Operative morbidity and mortality after liver resection.


	Anatomical major resection (n = 96)	Nonanatomical limited resection (n = 78)
Postoperative complications		
Bile leakage	6	2
Subphrenic abscess	3	2
Jaundice	3	
Ascites	1	
Pleural effusion	1	
Hepatic failure	2	
Pulmonary embolism		1
Peptic ulcer (bleeding)	1	
Enterocolitis (MRSA*)	1	
Total †	12 (12.5 %)	5 (6.4 %)
Mortality		
Operative death ‡	1	0
Hospital death §	1	0
Total	2 (2.1 %)	0 (0 %)

Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*.

† Number of patients who had one or more postoperative complications.

‡ Death within 30 days after surgery.

§ Death before discharge from the hospital after 30 day postoperative period.



**รูปที่ 3.** Tumor locations (gray areas) and type of liver resections (arrows) in patients in whom preoperative portal vein embolization is indicated. Small multiple metastases are located in the right lobe (Case 1 and 5) or one of multiple small tumors is adjacent to the hilum of the liver (Case 2, 3, and 4). In case 1, 2 and 5, limited resection of the left lobe is also necessary.

### 3. Resection margin

เป็นข้อตกลงกันโดยทั่วไปว่า resection margin 1 ซม. ถือเป็นมาตรฐานในการผ่าตัด โดยอาศัย IOUS เป็นตัวกำหนดขอบเขตของการผ่าตัด<sup>(7,13)</sup> อย่างไรก็ดี Scheele, et al.<sup>(7)</sup> พบว่าผู้ป่วยจำนวน 38 ราย ใน 131 ราย ที่มี resection margin 0.4 ซม. มีผู้ป่วยที่อยู่รอดถึง 5 ปี ได้ ตั้งนั้นในการผ่าตัด ตัด CRLM ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล ของเรื่องขนาด จำนวน หรือตำแหน่งของเนื้องอก ที่ไม่สามารถทำให้ได้ resection margin 1 ซม. แต่ได้ขอบเขตของเนื้อตับที่ปกติปகคลุนเนื้องอกໄว้ (clear margin) ก็ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสสมชีวิตยืนยาวได้<sup>(7,10)</sup>

### 4. Multiple/bilobar liver metastasis

ในอดีตผู้ป่วยที่มี CRLM ตั้งแต่ 4 ก้อนขึ้นไป หรือมี CRLM ในตับทั้ง 2 กลีบ (bilobar disease) ถือเป็นข้อห้ามในการผ่าตัด<sup>(9)</sup> อย่างไรก็ดี Imamura<sup>(10)</sup> พบว่าไม่มีความแตกต่างของการอยู่รอดในผู้ป่วยจำนวน 31 ราย ที่มีเนื้องอก

หลายก้อนเทียบกับผู้ป่วยจำนวน 34 รายที่มีเนื้องอกก้อนเดียว เช่นเดียวกับ Bolton<sup>(9)</sup> ที่ได้ทำการศึกษาถึงอัตราการอยู่รอดในผู้ป่วย CRLM โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น simple group ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่มี CRLM จำนวน 1-3 ก้อน และอยู่ในตับกลีบเดียวกัน กลุ่มที่สองเป็น complex group หมายถึงผู้ป่วยที่มี CRLM ตั้งแต่ 4 ก้อน ที่แยกกันในตับกลีบเดียวกันหรืออย่างน้อย 2 ก้อน ที่แยกกันในแต่ละกลีบ พบร่วมกันใน simple group 121 ราย มีอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี 36% และอัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ย  $43 \pm 4$  เดือน ซึ่งไม่แตกต่างจากผู้ป่วย complex group 44 ราย ที่มีอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี 37% และอัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ย  $39 \pm 11$  เดือน

ตั้งนั้น ถ้าสามารถผ่าตัดตัดตับได้ clear margin อย่างปลอดภัย จำนวนของเนื้องอก หรือการกระจายของเนื้องอกในตับทั้ง 2 กลีบ (bilobar disease) ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการทำผ่าตัด<sup>(3,4)</sup>

## 5. Surgical Technique

จุดมุ่งหมายของการผ่าตัดคือ การผ่าตัดเอาเนื้อของออกออกได้หมดโดยได้ clear margin และ มีอัตราเสี่ยงจากการผ่าตัดต่ำที่สุด<sup>(7)</sup>

**5.1 Parenchyma transection** ใช้ได้หลายวิธี ตั้งแต่ clamp fracture จนถึงวิธีการใหม่ ๆ เช่น ultrasonic and water jet dissector เพื่อเลาะเอาส่วนที่เป็นเนื้อตับออก และเหลือส่วนที่เป็นเส้นเลือดและท่อน้ำดีเข้าไว้ (vascular and biliary structure) ผูกแยกต่างหาก ไม่ควรผ่าตัดผ่านเนื้อตับจนถึงเนื้องอก เพื่อป้องกัน positive margin

ในการผ่าตัดตัดตับ ควรใช้ IOUS ทุกราย เพราะสามารถบอกถึงจำนวนของเนื้องอกได้อย่างแม่นยำ (มีรายงานว่าสามารถตรวจพบเนื้องอกเพิ่มจากการตรวจก่อนผ่าตัดถึง 10-15%) ช่วยบอกรความสัมพันธ์ระหว่างเนื้องอก กับเส้นเลือดภายในเนื้อตับ และยังช่วยบอกถึงระยะทางระหว่างแนวที่ทำการเลาะกับตัวเนื้องอกอีกด้วย ให้ได้ขอบเขตที่เพียงพอในการผ่าตัด และสามารถเอาเนื้องอกออกได้หมด<sup>(7)</sup>

การใช้ inflow occlusion ร่วมกับการลด central venous pressure (เหลือประมาณ 1-4 ซม.น้ำ) จะช่วยลดการเสียเลือดลงได้อย่างมาก inflow occlusion จากใช้วิธี Pringle maneuver, hemihepatic vascular occlusion technique หรือวิธี ischemic preconditioning and continuous clamping ก็ได้การดึงตับมาทางด้านหน้าโดยการดึง round ligament ก็จะช่วยลดความดันของเส้นเลือด hepatic vein และลดการเสียเลือดได้ ในรายที่ทำการผ่าตัดตับกลีบขวาของ (right hepatectomy) การเปิดแผลผ่าตัดเข้าซ่องอกด้านขวา ผ่านซ่องซีโครงที่ 9 จะช่วยทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้น<sup>(10)</sup>

**5.2 Management of the raw surface** โดยทั่วไปจะพบปัญหาเลือดออก และ น้ำดีรั่ว จากบริเวณแผลที่ตับใน ตับปกติน้อยมาก ซึ่งอาจจัดการได้โดยการใช้ fine suture ligation หรือ argon gas coagulation ในรายที่มีเลือดออกไม่มาก และใช้ fibrin tissue adhesive ในราย

ที่มีเลือดออกจากบริเวณแผลที่ตับมีบริเวณกว้าง<sup>(7)</sup>

## 6. Other Surgical Modality

**6.1 two-stage hepatectomy** Bismuth เสนอวิธีการผ่าตัดที่เรียกว่า two stage hepatectomy ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในขั้นต้นที่ไม่สามารถผ่าตัดได้โดยมีพื้นฐานจาก การศึกษาที่พบว่า ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ได้รับ neoadjuvant chemotherapy เนื่องจากอาจจะมีขนาดเล็กลงจนสามารถทำผ่าตัดได้ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอัตราการอยู่รอด เท่ากับผู้ป่วยที่สามารถทำผ่าตัดได้ตั้งแต่เริ่มต้น ขณะที่ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัด แต่ไม่สามารถเอาเนื้อของออกได้หมดจะมีอัตราการอยู่รอดไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัด ตั้งนั้นถ้าสามารถทำผ่าตัดครั้งแรกโดยพยายามเอาเนื้องอกออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากนั้นรอให้ตับส่วนที่เหลือเกิด hypertrophy ขณะเดียวกันก็ให้ systemic chemotherapy เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเนื้องอกที่เหลือ หลังจากนั้นทำการผ่าตัดตับครั้งที่ 2 โดยหวังผลที่จะเอาเนื้องอกออกให้หมดโดยจะต้องไม่มีการแพร่กระจายของเนื้องอกและตับส่วนที่เหลือจากการผ่าตัด สามารถลดการเกิดภาวะตับฯ ภายหลังการผ่าตัดได้<sup>(14)</sup>

Adam R, et al.<sup>(14)</sup> ได้ทำการศึกษาการทำ two stage hepatectomy ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหลายก้อนที่ไม่สามารถทำผ่าตัดได้ เมื่อจะได้รับ chemotherapy ก่อนผ่าตัดมาก่อนแล้ว 16 รายจากผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหลายก้อนที่ไม่สามารถทำผ่าตัดได้ทั้งหมดจำนวน 59 ราย (โดยที่เหลืออีก 43 รายสามารถทำการผ่าตัดตับ ภายหลังได้รับ neoadjuvant chemotherapy) โดยในการตัดตับครั้งแรกนั้นจะพยายามเอาเนื้องอกออกให้ได้มากที่สุดโดยเหลือเนื้อตับไว้ให้เพียงพอสำหรับ การคงอกรขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นจะทิ้งช่วงเวลา 3 สัปดาห์เพื่อให้ตับเกิดการอกรขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะให้ chemotherapy หลังผ่าตัด ช่วงเวลาสำหรับการทำผ่าตัดนั้นจะถูกกำหนดโดยปริมาณตับที่เหลือ การควบคุมเนื้องอกที่เหลือโดยการให้เคมีบำบัดและความเป็นไปได้ในการตัดตับครั้งที่ 2 ผลการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วย

13 รายใน 16 ราย (81 %) ที่สามารถทำการผ่าตัดตัดตับครั้งที่ 2 ได้ (ผู้ป่วยที่เหลือ อีก 3 รายนั้นมีเนื้องอกหลงเหลืออยู่หรือมีการกระจายของเนื้องอกออกนอกตับระหว่างที่ให้ chemotherapy หลังการผ่าตัด) โดยมีอัตราการอุดรอดที่ 3 ปี ภายหลังการตัดตับครั้งที่ 2 35 % และอัตราการอุดรอดโดยเฉลี่ย 31 เดือน ตามหลังการตัดตับครั้งที่ 2 และ 44 เดือน ตามหลังการวินิจฉัย CRLM ตามลำดับ การศึกษานี้พบมีการกลับมาเป็นซ้ำของเนื้องอกที่ตับ 6 ราย (ซึ่งในการศึกษานี้พยายามที่จะทำการผ่าตัดตัดตับครั้งที่ 3 ในกรณีที่สามารถทำการผ่าตัดได้)

การทำ two stage hepatectomy ช่วยให้สามารถทำการผ่าตัดเนื้องอกออกได้หมดในผู้ป่วย CRLM ที่ไม่สามารถผ่าตัดเนื้องอกออกบางกลุ่มได้ และช่วยทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้

## 6.2 Portal vein embolization (PVE)<sup>(15,16)</sup>

จากพื้นฐานความรู้ที่ว่าการที่อุด portal vein ด้านที่ไม่เปลี่ยนเนื้องอกนั้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิด ipsilateral atrophy และ contralateral hypertrophy ของเนื้อตับที่เหลืออยู่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการตัดเนื้องอกออกได้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เมื่อจากมีปริมาณตับที่เหลืออยู่หลังจากการผ่าตัดน้อยเกินไป

Azoulay,et al<sup>(15)</sup> ศึกษาการทำ PVE ในผู้ป่วย CRLM 30 ราย ที่มี Estimated rate of remnant functional liver parenchyma (ERRFLP) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 % ของปริมาตรของตับที่ทำหน้าที่โดยทำการตรวจด้วย CT volumetry และทำการคำนวณดังสมการ

$$\text{ERRFLP} = \frac{\text{Remnant liver volume}}{(\text{volume of entire liver} - \text{tumor volume})} \times 100 \%$$

ผลการศึกษา พบว่าการทำ PVE สามารถเพิ่ม ERRFLP ได้ถ่ายมีนัยสำคัญ (จาก 26 %  $\pm$  6 % เป็น 37 %  $\pm$  8 %) และมีผู้ป่วยถึง 19 ใน 30 คน (63 %) ที่สามารถทำการผ่าตัดตับได้หลังทำ PVE (ผู้ป่วยที่เหลือ 1 รายปฏิเสธการผ่าตัด อีก 1 รายมีการเติบโตของเนื้องอกภายในหลังได้รับ PVE และอีก 9 ราย พบร่วมนี้ของอกไม่สามารถผ่าตัดออกได้ขณะผ่าตัด) โดยที่มีอัตราการอุดรอด

ที่ 5 ปี ประมาณ 38 % ซึ่งไม่แตกต่างกันในกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องทำ PVE (40%)

## 7. Complication

อัตราตายที่ 30 วันในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตับในผู้ป่วยที่มีตับเป็นปกติ มีเพียง 0-5 %<sup>(7)</sup> ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดพอกสรุปได้ดังตารางที่ 3<sup>(3)</sup>

### Liver Metastasis Combined With Other Organs

ปอดเป็นอวัยวะที่พบการแพร่กระจายมากจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้บ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากตับ (ตับ = 33 %, ปอด = 22 %) Murata,et al.<sup>(2)</sup> ทำการศึกษาการผ่าตัดตับและปอดในผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายมาจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยจำนวน 30 ราย โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกผู้ป่วยมาทำการผ่าตัดดังนี้

1. สามารถทำการผ่าตัดตับมะเร็งลำไส้ใหญ่ออกได้หมด

2. มีการแพร่กระจายของเนื้องอกมาที่ตับและ/หรือปอดเท่านั้น

3. เนื้องอกที่ตับและ/หรือปอดสามารถผ่าตัดออกได้ และมีปริมาณของเนื้อตับ/ปอดภายหลังการผ่าตัดเพียงพอที่จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

4. ผู้ป่วยแข็งแรงพอที่จะทนการผ่าตัดได้

การผ่าตัดตับทำ nonanatomical resection จำนวน 15 ราย, anatomical resection จำนวน 11 ราย และทำหั้ง 2 อย่าง จำนวน 4 ราย ซึ่งอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอก โดยให้ได้ขอบเขตของเนื้อปกติมากกว่า 1 ซม. การผ่าตัดตับปอดมี partial resection จำนวน 9 ราย, anatomical resection (lobectomy หรือ subsegmentectomy) จำนวน 15 ราย ในรายที่เนื้องอกอยู่ proximal area ของปอด และทำหั้ง 2 อย่าง จำนวน 6 ราย

ระยะเวลาในการผ่าตัดนั้น ผู้ป่วยจำนวน 17 ราย ทำการผ่าตัดปอดภายหลังการผ่าตัดตับ ผู้ป่วยจำนวน 1 รายทำการผ่าตัดตับภายหลังการผ่าตัดตับปอด และผู้ป่วยจำนวน 12 ราย ทำการผ่าตัดตับและปอดพร้อมกัน โดยใน

ตารางที่ 3. Complications of liver resection.

	Schlag,1990	Fortner,1984	Scheele,1995	Doci,1995	Fong,1997
Total Number of Patients	122	75	469	208	456
(%) (%) (%) (%) (%) (%)					
Liver-Related complications					
Hemorrhage	--	1	2	2	1
Bile Fistula	4	--	3	5	3
Perihepatic Abscess	9	7	1	6	1
Liver Failure	--	4	5	1	1
Renal Failure	--	--	1	1	1
Portal Vein Thrombosis	--	1	--	--	--
Infections					
Wound	6	1	2	2	3
Sepsis	2	--	--	--	1
General Complication					
GI Bleeding	--	--	1	--	--
Deep Vein Thrombosis	--	1	1	--	1
Pulmonary Embolism	--	1	1	--	1
Cardiac / MI	5	1	1	1	2
Pneumonia	8	4	--	--	2
Pleural Effusion	--	8	5	--	--

Key : MI = Myocardial Infarction ; GI = Gastrointestinal

แต่ละกลุ่มนั้นไม่พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตภายในหลังการผ่าตัด และมีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาณั้นพบว่าการผ่าตัดตัดตับและปอดในกรณีที่มีมะเร็งแพร่กระจายมาจากมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมีอัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ย 30 เดือน อัตราการอยู่รอดที่ 3 ปี และ 5 ปี 49.3 % และ 43.8 % ตามลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ได้แก่ synchronous metastasis และ bilateral pulmonary metastasis และได้แนะนำว่าการผ่าตัดตัดตับและปอด จะช่วยให้ผู้ป่วยที่สามารถผ่าตัดได้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้

Regnard, et al.<sup>(17)</sup> ทำการศึกษาผลของการผ่าตัดตัดปอด ในกรณีที่มีการแพร่กระจายมาจากมะเร็งลำไส้

ใหญ่ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดตัดตับมาแล้วจำนวน 43 ราย โดยมีเกณฑ์การเลือกผู้ป่วยไม่ต่างจากการศึกษาแรก คือ สามารถควบคุมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่ตับได้แล้ว และไม่มีการแพร่กระจายออกไปนอกปอด พบว่าสามารถทำผ่าตัดโดยไม่มีอัตราร้าย และมีภาวะแทรกซ้อนที่ต่ำ มีอัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 19 เดือน และ อัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี 11%

- ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ได้แก่
- 1) การมีระดับ CEA สูงก่อนการผ่าตัดตัดปอด
  - 2) การผ่าตัดตัดปอดซ้ำ (repeat lung resection)
  - 3) การที่มีมะเร็งแพร่กระจายมาที่ตับและปอดพร้อมกัน

Regnard ได้แนะนำว่าการผ่าตัดจะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีระดับ CEA เป็นปกติก่อนการผ่าตัดปอด และเป็น late metastatic synchronous metastasis

### **Recurrent Liver Metastasis**

แม้ว่าผู้ป่วย CRLM จะมีอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังได้รับการผ่าตัด ตัดตับ แต่ยังพบข้อตារากลับมาเป็นข้าของโรคสูงถึง 48-78 % โดยมักเกิดขึ้นภายใน 2 ปี ตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดคือได้แก่ตับ (30-70 %), ปอด (20 %), peritoneal and locoregional recurrence (10-20 %)<sup>(18)</sup> ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ศัลยแพทย์ต้องทำการตรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังการกลับมาเป็นใหม่ของโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ตรวจพบและรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ

### **1. Follow – up after liver resection**

ควรนัดผู้ป่วยมาพบประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน เพื่อตรวจร่างกาย ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ และระดับ CEA การพบระดับ CEA ที่สูง ก่อนการผ่าตัดและกลับมาเป็นปกติหลังการผ่าตัดจะช่วยยืนยันว่าสามารถตัดเลาเนื้องอกออกได้หมด แต่ในรายที่ CEA ไม่กลับมาเป็นปกติหลังการผ่าตัดต้องสงสัยว่าอาจมีเนื้องอกหลงเหลืออยู่ได้ และควรทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป<sup>(3)</sup>

หลังจากนั้นควรนัดผู้ป่วยมาพบทุก 3 เดือน เพื่อทำการตรวจร่างกาย ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ และระดับ CEA ควรตรวจ abdominal / pelvic CT Scan ทุก

6 เดือน และตรวจ chest x-ray และ colonoscopy ทุกปี ควรตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี<sup>(3)</sup>

### **2. Repeat Hepatectomy**

Sugarbaker, et al.<sup>(19)</sup> ได้ทำการศึกษาการผ่าตัดตัดตับซ้ำ ในผู้ป่วย ที่มี CRLM กลับมาเป็นใหม่ จำนวน 170 ราย พบร่วมมี อัตราการอยู่รอดที่ 3 ปี และ 5 ปี 45 % และ 32 % ตามลำดับ อัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ย เท่ากับ 34 เดือน และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีได้แก่ disease free interval น้อยกว่า 1 ปี, จำนวน CRLM และการพบ การแพร่กระจายของนodule การให้ adjuvant ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ช่วยเพิ่ม อัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี ได้เล็กน้อย (จาก 29 % เป็น 39%) และสรุปว่าการผ่าตัดตับซ้ำ ให้ผลการรักษาที่ดี โดยที่มี ภาวะแทรกซ้อน และอัตราตาย ไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดตับครั้งแรก จึงควรทำการผ่าตัดตับซ้ำในผู้ป่วยทุกรายที่สามารถทำได้

การตัดก้อนเนื้องอกออกไม่นحمدเป็นสาเหตุสำคัญในการกลับมาเป็นซ้ำ ดังนั้นศัลยแพทย์ควรทำทุกวิถีทาง เพื่อจะตัดก้อนเนื้องอกออกให้หมดตั้งแต่การทำผ่าตัดตับครั้งแรก (ตาราง 4)<sup>(19)</sup>

ก่อนที่จะทำการผ่าตัด ตัดตับซ้ำ นั้นควรตรวจหา micrometastasis ที่ตับ และ การแพร่กระจายของเนื้องอก ออกนอกตับ ที่อื่นให้ก่อนและควรอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากผ่าตัดตับในครั้งแรก<sup>(18)</sup>

### **3. Palliative Treatment**

ในผู้ป่วยรายที่มีเนื้องอกที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ กองการให้เคมีบำบัดแล้ว ยังมีการรักษาอื่น ๆ ได้แก่

### **ตารางที่ 4. Precautions to minimize missed liver lesions.**

1. Abdominal CT scan with 1 cm cuts using maximal intravenous contrast
2. Preoperative liver MRI with gadolinium in patients with equivocal CT findings
3. Intraoperative liver ultrasound
4. Intraoperative bimanual liver palpation

### 3.1 Cryoablation

เป็นการใช้ความเย็น ทำให้เซลล์แข็ง และละลายอย่างรวดเร็ว ทำให้เซลล์นั้นตาย เป็นวิธีที่ใช้เป็น palliative treatment เท่านั้น และไม่ควรใช้แทน การผ่าตัด ในรายที่สามารถตัดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น การแข็งเนื้องอกก้อนหนึ่ง ๆ จะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที และการวาง probe ครั้งหนึ่งนั้นจะทำลาย เนื้อเยื่อได้ในรัศมีเพียง 7 เซนติเมตร โดยทั่วไปมักจะแข็งเนื้องอกได้ไม่เกิน 5 ก้อน การแข็งเนื้องอก ใกล้กับเส้นเลือดใหญ่นั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาเลือดออกตามน้ำหลังผ่าตัดได้เมื่อมีเลือดอุด ฯ ให้ผลผ่าน เส้นเลือดที่โดน แข็งไม่หมด โดยสรุปแล้วควรใช้วิธีนี้ในผู้ป่วยรายที่มีเนื้องอกที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ที่มีการกระจายของเนื้องอกหลายตำแหน่งร่วมกับการให้เคมีบำบัดหรือใช้เสริมกับการผ่าตัด<sup>(1,3)</sup>

### 3.2 Radiofrequency ablation

เป็นการใช้ความร้อนจากเซลล์มะเร็ง โดยใช้ Radiofrequency electrode ผ่านทาง ultrasound, CT หรือ MRI guidance หรืออาจใช้ผ่านทาง laparoscopy หรือ open surgery ก็ได้ ข้อดีอื่น ๆ ที่เหนือกว่า Cryoablation ก็คือรากของเครื่องมือถูกกว่า และการใช้ probe ขนาดเล็กสามารถทำโดยวิธี ผ่านทางผิวนั้นได้ ข้อจำกัดคือ สามารถ ทำลายเนื้องอกได้เป็นบริเวณแคบกว่า คือ ไม่เกิน 3 ซม. และยังประเมิน บริเวณที่ถูกทำลาย ได้ยากกว่า (ซึ่งใน Cryoablation การใช้ IOUS จะบอกขนาดของเนื้อเยื่อที่โดนทำลายได้โดยจะพบเป็น homogeneous hypoechoic lesion)<sup>(1,3)</sup>

โดยสรุปแล้วทั้ง 2 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือใช้เสริมกับการผ่าตัด คงต้องรอการศึกษาเปรียบเทียบ ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพระยะยาว ของเครื่องมือทั้งสองชนิดต่อไป

## สรุป

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการค้นคว้าพัฒนาในการผ่าตัด และรักษาผู้ป่วยที่เป็น CRLM ขึ้นมาก ซึ่ง

เป็นผลมาจากการผ่าตัดตัดตับที่ดีขึ้น และข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดที่กว้างขึ้น สามารถให้การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยประมาณ 25 % เท่านั้นที่สามารถผ่าตัดได้ดังนั้นบทบาท ของศัลยแพทย์ที่จะช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้คือ การตรวจติดตาม ผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่หลังการผ่าตัด เพื่อจะได้ตรวจพบเนื้องอกตั้งแต่ระยะแรก ๆ การเลือกระยะเวลาในการผ่าตัด ที่เหมาะสมและเทคนิคการผ่าตัดที่ดี รวมถึงการตรวจติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัดจะทำให้ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## อ้างอิง

1. Yoon SS, Tanabe KK. Surgical treatment and other regional treatments for colorectal cancer liver metastases. Oncologist 1999; 4(3):197 - 208
2. Murata S, Moriya Y, Akasu T, Fujita S, Sugihara K. Resection of both hepatic and pulmonary metastases in patients with colorectal carcinoma. Cancer 1998 Sep 15;83(6): 1086 - 93
3. Fong Y. Surgical therapy of hepatic colorectal metastasis. CA Cancer J Clin 1999 Jul-Aug; 49(4): 231 - 55
4. Stangl R, Altendorf-Hofmann A, Charnley RM, Scheele J. Factors influencing the natural history of colorectal liver metastases. Lancet 1994 Jun 4; 343(8910): 1405 - 10
5. Nakamura S, Suzuki S, Baba S. Resection of liver metastases of colorectal carcinoma. World J Surg 1997 Sep; 21(7): 741 - 7
6. Minagawa M, Makuuchi M, Torzilli G, Takayama T, Kawasakis, Kosuge T, Yamamoto J, Imamura H. Extension of the frontiers of surgical indications long-term results in the treatment of liver metastases from colorectal cancer:

- long-term results. Ann Surg 2000 Apr; 231(4): 487 - 99
7. Scheele J, Altendorf-Hofmann A. Resection of colorectal liver metastases. Langenbecks Arch Surg 1999 Aug; 384(4): 313 - 27
  8. Lyass S, Zamir G, Matot I, Goitein D, Eid A, Jurim O. Combined colon and hepatic resection for synchronous colorectal liver metastases. J Surg Oncol 2001 Sep; 78(1): 17 - 21
  9. Bolton JS, Fuhrman GM. Survival after resection of multiple bilobar hepatic metastases from colorectal carcinoma. Ann Surg 2000 May; 231(5): 743 - 51
  10. Imamura H, Kawasaki S. Treatment strategy for multiple hepatic metastases of colorectal carcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Surg 1999; 6 (1): 23 - 9
  11. Yamamoto J, Sugihara K, Kosuge T, Takayama T, Shimada K, Yomasaki S, Sakamoto M, Hirohashi S. Pathologic support for limited hepatectomy in the treatment of liver metastases from colorectal cancer. Ann Surg 1995 Jan; 221(1): 74 - 8
  12. Kokudo N, Tada K, Seki M, Ohta H, Azekura K, Ueno M, Musubara T, Takahashi T, Nakajima T, Muto T. Anatomical major resection versus nonanatomical limited resection for liver metastases from colorectal carcinoma. Am J Surg 2001 Feb; 181(2): 153 - 9
  13. Cady B, Jenkins RL, Steele GD Jr, Lewis WD, Stone MD, McDermott WV, Jessup JM, Bothe A, Lalor P, Lovett EJ. Surgical margin in hepatic resection for colorectal metastasis: a critical and improvable determinant of outcome. Ann Surg 1998 Apr; 227(4): 566 - 71
  14. Adam R, Laurent A, Azoulay D, Castaing D, Bismuth H. Two-stage hepatectomy: a planned strategy to treat irresectable liver tumors. Ann Surg 2000 Dec; 232(6): 777 - 85
  15. Azoulay D, Castaing D, Smail A, Adam R, Cailliez V, Laurent A, Lemoine A, Bismuth H. Resection of nonresectable liver metastases from colorectal cancer after percutaneous portal vein embolization. Ann Surg 2000 Apr; 231(4): 480 - 6
  16. Kawasaki S, Makuchi M, Kakazu T, Miyagawa S, Takayama T, Kosuge T, Sugihara K, Moriya Y. Resection for multiple metastatic liver tumors after portal embolization. Surgery 1994 Jun; 115(6): 674 - 7
  17. Regnard JF, Grunenwald D, Spaggiari L, Girard P, Elias D, Ducreux M, Baldeyrou P, Levasseur P. Surgical treatment of hepatic and pulmonary metastases from colorectal cancers. Ann Thorac Surg 1998 Jul; 66(1): 214 - 9
  18. Nakamura S, Suzuki S, Konno H. Resection of hepatic metastases of colorectal carcinoma: 20 years experience. J Hepatobiliary Pancreat Surg 1999; 6(1): 16 - 22
  19. Sugarbaker PH. Repeat hepatectomy for colorectal metastases. J Hepatobiliary Pancreat Surg 1999; 6(1): 30 - 8

## กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์

ท่านสามารถได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ กลุ่มที่ 3 ประเภทที่ 23 (ศึกษาด้วยตนเอง) โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งแพทยสภา (ศป.) จากการอ่านบทความเรื่อง “การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายมาที่ตับ (ตอนที่ 1)” โดยตอบคำถามข้างล่างนี้ พร้อมกับส่งคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องโดยใช้แบบฟอร์มคำตอบท้ายคำ답น แล้วใส่ช่องพร้อมของปล่า (ไม่ต้องติดแสดงบีบ) จำนวนของถังตัวท่านสองถัง

ศ. พ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  
บรรณาธิการ จุฬาลงกรณ์เวชสาร  
และประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร  
ตึกอบรมวิชาการ ชั้นล่าง  
เขตปทุมวัน กทม. 10330

จุฬาลงกรณ์เวชสารขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งเบลย์คำตอบพร้อมหนังสือรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอย่างเป็นทางการ ดังกล่าวแล้วข้างต้นสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกจุฬาลงกรณ์เวชสารเท่านั้น สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกแต่ถ้าท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกจุฬาลงกรณ์เวชสารสำหรับวาระปี 2545 (เพียง 200 บาทต่อปี) ทางจุฬาลงกรณ์เวชสารยินดีดำเนินการส่งเบลย์คำตอบจากการอ่านบทความให้ดังแต่ฉบับเดือนมกราคม 2545 จนถึงฉบับเดือนธันวาคม 2545 โดยสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกินเดือนมีนาคม 2546 และจะส่งหนังสือรับรองชนิดสรุปเป็นรายปีว่าท่านสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดโดยจุฬาลงกรณ์เวชสาร จำนวนกี่ครั้ดิตในปีที่ผ่านมา โดยจะส่งให้ในเดือนเมษายน 2546

### คำถาม - คำตอบ

1. What is the appropriate treatment for the 75-year-old patient who has cecal cancer and liver metastasis at lateral segment of liver ?
  - A. Right hemicolectomy
  - B. Right hemicolectomy and postoperative chemotherapy
  - C. Right hemicolectomy and lateral segmentectomy
  - D. Preoperative chemotherapy then reassess the patients
  - E. Right hemicolectomy and left hemihepatectomy

.....  
คำตอบ สำหรับทความเรื่อง “การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายมาที่ตับ (ตอนที่ 1)”

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545

รหัสสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 3-15-201-2003/0212-(1023)

ชื่อ - นามสกุลผู้ขอ CME credit ..... เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม .....  
ที่อยู่ .....  
.....

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. (A) (B) (C) (D) (E) | 4. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 2. (A) (B) (C) (D) (E) | 5. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 3. (A) (B) (C) (D) (E) |                        |

2. What is the accepted margin of liver resection in colorectal liver metastases ?
- A.  $\leq 0.5$  cm
  - B.  $\leq 1.0$  cm
  - C.  $\geq 0.5$  cm
  - D.  $\geq 1.0$  cm
  - E.  $\geq 2$  cm
3. What is the preferred treatment for the patient who has multiple colorectal liver metastasis in right lobe of liver but small size of left lobe ?
- A. Preoperative chemotherapy then surgery
  - B. Two-stage hepatectomy
  - C. Preoperative chemotherapy only due to multiple tumor
  - D. Preoperative portal vein embolization then surgery
  - E. Right hemihepatectomy
4. A 40-year -old patient had combined sigmoidectomy for sigmoid cancer and wedge resection for liver metastasis of right lobe of liver 3 months ago. During follow-up, CEA level is rising from 3 ng/ml to 10 ng/ml. CAT scan of chest and abdomen demonstrated isolated lung metastasis. Which is the appropriate management in this patient?
- A. chemotherapy then reassess the patient
  - B. lung resection
  - C. colonoscopy then lung resection
  - D. MRI abdomen
  - E. Follow up the patients for another 3 months to observe lung metastasis.
5. What is the suitable treatment for the patient who has recurrent liver metastasis, except ?
- A. Work up for extrahepatic disease
  - B. Assess the resectability
  - C. Start chemotherapy in spite of resectable tumor
  - D. Surgery, if possible
  - E. Radiofrequency ablation

ท่านที่ประสงค์จะได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่อง (CME credit)  
กรุณาส่งคำตอบพร้อมรายละเอียดของท่านตามแบบฟอร์มด้านหน้า

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพง จิตต์มิตรภาพ  
ประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร ตึกอบรมวิชาการ ชั้นล่าง  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เขตปทุมวัน กรุง. 10330