

# การแพ้ร่องเท้ายางในผู้ป่วยหัวไป

## Contact dermatitis with canvas and rubber shoes.

\* สุนิศย์ เกิมสวัสดิ์ พ.บ., D.T.M. (C.A.L.)

.....

ผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังที่บริเวณหลังเท้าทั้งสองข้างเนื่องจากการแพ้ยางที่นำมารองเท้าสาน, รองเท้าผ้าใบ, หรือสายคาดเกี้ยบ พนได้บ่อยครั้งในสถานตรวจโรคผิวหนัง ตามสัตติของสถานตรวจ โรคผิวหนัง แห่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๔๘๙ มีผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นโรคนี้ ๕ ราย เป็นชาย ๔ ราย หญิง ๑ ราย ดังสถิติ ดังกล่าวแล้ว เราชพญานี้ป่วยประมาณเดือนละ ๑ คน จากการซักประวัติพบว่ามีบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการแนะนำและรักษาให้ถูกต้อง ผู้ป่วยบางคนได้รับการรักษาโดยให้ Penicillin, Terramycin และ Calcium โดยแพทย์ผู้รักยามุ่งจะรักษาอาการทางผิวหนังแต่อย่างเดียว 医師ผู้รักยามุ่งจะรักษาอาการทางผิวหนังแต่เดียวเดียว แพทย์ผู้รักยามุ่งจะรักษาอาการทางผิวหนังที่จะตัดตันแต่โดยการแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกใช้รองเท้าไปเสีย ดังนั้นโรคจึงไม่หาย ถ้ายังเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง บางรายเนื่องจากผู้ป่วยเกามากทำให้เกิดหนังบริเวณที่เป็นหนามาก ยากกับแพทย์ที่มาพบผู้ป่วยเป็นคนสุดท้ายจะรักษาให้หายได้ ทำให้ผู้ป่วยเสียเวลาทำมาหากินมาก แต่เดียวจึงเห็นมากในการช้อป ยาที่แพงๆ ที่ไม่จำเป็น ดังนั้นผู้นี้รรยาจึงเห็นสมควร

หันยกอาบน้ำหานี้ มาเล่าสู่ท่าน เพื่อให้แพทย์ทั้งหลายในวันนี้ ชั่งน้ำท่านคงจะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายแบบเรื่องหญ้าปากคอก แต่ถ้าท่านไม่คิดถึงโรคนี้ การกำนายโรคอาจยากมากแบบเดือนผ่านๆ กันหากได้ การแพ้รองเท้านี้ในบ้านเราผู้ป่วยมักให้ประวัติว่าเหงื่อออออกมาที่เท้า หรือมีก้มก้นในผู้ได้รับรองเท้ายางยาน้ำ (ดูรูปที่ ๑) น้ำหรือเหงื่อจะกัดยางเบื้อย และลະลาย ย่างนา ถูกกับผิวหนังบริเวณหลังเท้าทำให้ผู้ป่วยแพ้ จากการตรวจร่างกายเราจะพบผิวหนังบริเวณหลังเท้าที่ถูกกับสายคาดยาง หรือถูกกับยาง รองเท้าจะมีลักษณะตี่แดงมึน้ำเหลืองให้เปลี่ยนในรูป acute eczema ถึงที่สุดตาก็อผิวหนังที่เป็น เห็นเป็นรูปสายรองเท้า ชัดเจน (ดูรูป ๒) ถ้าผู้ป่วยที่แพ้ยางที่ทำสายคาดเกี้ยบมักจะเห็นผิวหนังที่เป็นต่อง กับบริเวณที่สายคาด ผู้ป่วยที่แพ้รองเท้ายางนี่น์ มากเมื่อนานที่ต่องระหว่างวันนี้หัว แม่เท้าแล้ว ตามออกไป วันที่จะยืนยันก็คือ ตัดยางรองเท้ามาเป็นแผ่นเล็กๆ แล้วนำมาทำ Patch test (ดูรูป ๓) โดยนำมาระบบบนเนื้อแผลขา แล้วเอา adhesive plaster ปิด ภายใน ๔๘ ชั่วโมง เราชพญ่าผิวหนังบริเวณที่ทำการทดสอบนี้จะรู้สึกคันมึน้ำ

\* อ้างอิงโดยวิทยานนี้แผนกอายุรกรรม ร.ร. จุฬาลงกรณ์

เหลืองไว้ และมีรูปคล้ายขันย่างที่นำไปปิด ในระยะ acute stage ไม่ทำการทดสอบ เพราะจะทำให้อาการที่เท้าเป็นมากขึ้น วิธีแยกโรคคือเรามักต้องแยกจากโรคเท้าเปื่อยจากเชื้อรา(fungus) ซึ่งมักพบตามซอกนิ้วเท้า และแพร่อง มาทางด้านฝันเท้า วิธีรักษาคือ แนะนำให้ผู้ป่วยเลิกใช้รองเท้าหางนี้เสีย (ดูรูป 4) และรักษาตามอาการ เช่นในระยะมีน้ำเหลืองมากก็ใช้ wet dressing ด้วยต่างทับทิม ๑:๑๐,๐๐๐ และในระยะเรื้อรังเราก็ใช้ยาพอกน้ำมัน น้ำมันพาก Hydro-cortisone ใช้ได้ผลดีมากในระยะเรื้อรังนี้ แต่ผู้ใช้ควรคิดถึงเศรษฐีของผู้ป่วย เพราะน้ำมันพาก Hydro-cortisone แพงมาก และโดยการรักษาโดยใช้น้ำมันอย่างอ่อนที่สุดกว่าก็หายได้เหมือนกัน ถึงแม้จะช้ากว่ากันเล็กน้อย

### สรุป:-

- รายงานผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังบริเวณหลังเท้าเนื่องจากแพะหางที่นำมาทำเป็น

รองเท้าหรือสายคาดรองเท้า ๕ ราย

- ผู้ป่วยมักให้ประวัติว่าเหงื่อออกมากหรือใส่รองเท้าหางยาน้ำ ข้างละลายน้ำปูกหลังเท้าทำให้แท้
- ผิวหนังมักแดง มีน้ำเหลืองไหลเยื่อบนแบบ acute eczema รอยที่เป็นมักเป็นไปตามรอยที่ข้างมาทางติดกันเนื่อง
- การทดสอบใช้ตัดยาง จากรองเท้ามาทำ patch test.
- วิธีแยกโรค ต้องแยกจากโรคเท้าเปื่อยซึ่งเกิดจากเชื้อรา ซึ่งมักจะพบรอยที่เป็นที่ซอกนิ้วเท้า
- การรักษา แนะนำผู้ป่วยให้ดีใช้รองเท้าหางนี้เสีย นอกนั้นรักษาตามอาการ

### Books of References:-

- (1.) OLIVERS. ORMSBY AND HAMILTON MONTGOMERY, DISEASES OF THE SKIN.

### แก้คำพิเศษ

ของปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

คำว่า นักเรียนทุน “ภูมิพล” ให้แก่เป็น นักเรียนทุน “อนันนท์หิดล”


หน้า ๕ บรรทัดสุดท้าย



รูปรองเท้าแบบต่างๆ ที่ทำให้เกิดการแพ้ได้ คือรูปแสดงเกี่ยวกับสาย  
ยางคาด, รองเท้ายางแบบญี่ปุ่น, รองเท้าผ้าใบ รองเท้ายางแบบสาน ซึ่งยางเหล่านี้  
มักจะถูกละลายโดยเหงื่อมาถูกกับผิวนังบวณหลังเท้า ทำให้ผู้ป่วยแพ้



แสดงให้เห็นอาการทางผิวนังบวณหลังเท้าที่ถูกกับสายคาดรองเท้า  
มีลักษณะสีแดง มีน้ำเหลืองไหลเยื่อมอยู่ในลักษณะ acute eczema ผิวนัง  
บวณที่เป็นเห็นเป็นไปตามรูปสายคาดรองเท้าชัดเจน



วิธีทดสอบทางผิวนัง ใช้ตัดสายรั้ดรองเท้าที่มานูกกับบริเวณที่เป็น แล้วนำชิ้นยางกว้างยาวประมาณ  $3 \times 3$  มม. มาปิดแผลบริเวณเท้า แล้วเอา adhesive plaster ปิดทับลงไป อ่านผลภายใน 48 ชั่วโมง จะพบมีรอยแดงในบริเวณที่พันยางไปนูก



วิธีรักษา แนะนำให้ผู้ป่วยเลิกใช้รองเท้าที่แพ้ และรักษาตามอาการเท้าก็จะกลับเข้าสู่สภาพปกติ