

## นิพนธ์ต้นฉบับ

# การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจอุจจาระด้วยวิธี Simple smear, Simple sedimentation และ Formalin-ether concentration.

เกศิน จันทชุน\*  
นิกา รุจิธรรมกุล\*

**Chanthachume K, Rujithamakul N. A comparison of Simple smear, Simple sedimentation and Formalin - ether concentration techniques in stool examination for parasites. Chula Med J 1986 Feb ; 30 (2) : 133-143**

*Three methods were used to detect intestinal helminthic eggs and protozoa of 323 fecal specimens which were sent to the Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University from March to May 1985.*

*Results showed that parasitic infections were discovered by Simple smear in 98 cases (30.3%), by Simple sedimentation in 189 (58.5%) and Formalin-ether concentration technique in 242 (74.9%).*

*Among the three methods the best result in stool examination was Formalin-ether concentration. Although Formalin - ether concentration yielded the best results, in the detection of *Strongyloides* larvae, statistical analyses revealed that there was difference between the Formalin-ether and Simple sedimentation techniques, while Simple smear remains the suitable method for the detection of protozoan trophozoites.*

\* ภาควิชาปarasitology คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\* \* นิติศึกษาในการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การตรวจจาระเพื่อหาไข่ของหนอนพยาธิในลำไส้หรือระยะ trophozoite และระยะ cyst ของ protozoa นั้น มีหลายวิธี แต่อาจแบ่งตามหลักการได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ วิธี simple smear (วิธีธรรมชาติ) และวิธี concentration (วิธีทำให้เข้มข้น)<sup>(1)</sup>

วิธี Simple smear เป็นวิธีเดิม แต่ในปัจจุบันยังเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง เพราะทำง่าย สะดวก เร็ว ไม่เสียเปลือง และเป็นวิธีที่มีความไวเพียงพอ สามารถตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้ได้ทุกชนิด และบอกปริมาณเชื้อปรสิตที่ตรวจพบได้โดยประมาณ<sup>(2)</sup>

วิธี Concentration ที่นิยมกันคือ วิธีทำให้เชื้อปรสิตลอยตัว (Flootation concentration technic) และวิธีทำให้เชื้อปรสิตตกตะกอน (Sedimentation concentration technic) วิธีทำให้เชื้อปรสิตลอยตัวนั้น มีข้อเสียคือ ไม่อาจใช้ตรวจหาไข่หนอนพยาธิบางชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่า 1.180<sup>(3)</sup> ส่วนวิธีทำให้เชื้อปรสิตตกตะกอนนั้น วิธีที่นิยมคือ Formalin-ether concentration technic<sup>(4)</sup> ซึ่งวิธีหลังนี้ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับได้ใช้กันมานานกว่า 20 ปีแล้ว และให้ผลเป็นที่น่าพอใจที่สุด<sup>(5,6,7,8,9)</sup> Simple sedimentation technic เป็นวิธีทำให้สิ่งส่งตรวจเข้มข้น อีกวิธีหนึ่งที่อาศัยหลักทำให้เชื้อปรสิตตกตะกอน จัดว่าเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ประหยัดทั้งอุปกรณ์และเวลา

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบผลการตรวจจาระด้วยวิธี Simple sedimentation กับวิธีที่นิยมใช้กันอีก 2 วิธีคือ วิธี Simple smear และวิธี Formalin-ether concentration เพื่อหารือวิธีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติให้ได้ผลดีมากที่สุด

## วัสดุและวิธีการ

ตรวจจาระผู้ป่วยที่ส่งมา�ังภาควิชาปราสาติ-วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 323 ราย ด้วยวิธี Simple smear, วิธี Simple sedimentation และวิธี Formalin-ether concentration ซึ่งการตรวจจาระทั้งหมดใน 3 วิธีนี้ทำโดยผู้ตรวจจาระเดียวกัน

วิธี Simple smear ทำโดยหยดน้ำเกลือ (normal saline solution) ลงบนกระจกสไลด์ ใช้ไม้ป้ายอุจจาระประมาณ 1-2 มก. หรือข้นด้วยเล็กกว่าหัวไม้ปืนไฟ เกลี่ยอุจจาระและน้ำเกลือให้เข้ากันดีเพื่อให้ได้พิล์มน้ำ ปิดด้วยแผ่นกระจกรอบแล้วนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 400 เท่า (high dry power) และทำการเกลี่ยอุจจาระเพื่อนำไปตรวจอีกแผ่นโดยวิธีการดังกล่าว มาแล้ว แต่ใช้น้ำยาที่อ่อนดีความเข้มข้น 1%

วิธี Simple sedimentation วิธีนี้ดัดแปลงขึ้นโดยใช้ไม้ป้ายอุจจาระ ประมาณ 1 กรัม ใส่ลงในถ้วยแก้ว (beaker) ขนาด 50 มล. เติมน้ำเกลือ (normal saline solution) ลงไป 1 มล. ใช้ไม้คนให้อุจจาระละลายในน้ำเกลือจนอุจจาระไม่เหลือเป็นก้อน เทอุจจาระจากถ้วยแก้วลงใน แก้วที่ใช้สำหรับตกตะกอน (sedimentation flask) หรือหลอดแก้วสำหรับบันแยก (Centrifuge tube) ขนาด 15 มล. ถ้าอุจจาระมีภากมาก ให้กรองอุจจาระผ่านผ้า gauze หนึ่งหรือสองชั้น ก่อนเทลงในหลอดแก้ว เติมน้ำเกลืออีก 9 มล. ปิดปากหลอดแก้วด้วยจุกยางเขย่าด้วยมือนาน 10-20 วินาที เปิดจุกยางแล้วตั้งหลอดแก้วให้อ้อมในแนวตรง นานประมาณ 15 นาที โดยระวังอย่าให้กระแทกกระเทือนจากนั้น เทเน้าใสส่วนบนทึบดูดเอาส่วนตะกอนที่ก้นหลอด หมายดลองบนกระจกสไลด์ที่หยดน้ำเกลือ

และกระเจกสไลด์อีกแผ่นที่หยดน้ำยาไอโอดีนไว้แล้ว  
ปฏิบัติเหมือนวิธี simple smear

วิธี Formalin-ether concentration วิธี  
นี้ดัดแปลงมาจากวิธีของ Ritchie<sup>(4,10)</sup> เพื่อให้ขึ้น  
ตอนในการทำสัดดาวขึ้น วิธีการทำโดยละลายอุจจาระ  
ประมาณ 1 กรัมในน้ำเกลือ 10-20 มล. นำไปบีบ  
ที่ 3,000 รอบ/นาที นาน 1 นาที เทน้ำส่วนบนทิ้ง  
เพิ่ม 10% formalin 10 มล. ลงไปและใช้มีดคุณ  
ให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้นานประมาณ 5 นาที จากนั้นเติม  
ether ลงไป 3 มล. เขย่าแรง ๆ ประมาณ 1-2 นาที  
จึงนำไปบีบจนเดิม เทน้ำส่วนบนและหากทิ้งไว้  
หมด เหลือแต่ส่วนที่ติดตะกอนอยู่กับหลอด ถูดเอา  
ส่วนตะกอนนี้มาหยอดลงบนกระเจกสไลด์ที่หยดน้ำ  
เกลือไว้แล้ว และ กระเจกสไลด์อีกแผ่นที่หยดน้ำยา  
ไอโอดีนไว้ แล้วปฏิบัติเหมือนวิธี Simple smear

## ผล

จากการตรวจอุจจาระ 323 ราย โดยวิธี Simple smear ตรวจพบโรคติดเชื้อทางปราสิต 98 ราย อัตราที่พบ 30.3% โดยวิธี Simple sedimentation ตรวจพบ 189 ราย อัตราที่พบ 58.5% และ โดยวิธี Formalin-ether concentration ตรวจพบ 242 ราย อัตราที่พบ 74.9%

ตรวจพบ protozoa ทั้งหมด 30 ราย (บาง  
รายตรวจพบ protozoa มากกว่า 1 ชนิด) ซึ่งพบ  
ทั้งระยะ trophozoite และระยะ cyst การตรวจ  
พบ trophozoite นั้น พบโดยวิธี Simple smear  
เกือบทั้งสิ้น มีเพียงรายเดียวที่ตรวจพบโดยวิธี  
Simple sedimentation คือ *Entamoeba coli*  
trophozoite ส่วนวิธี Formalin-ether concen-  
tration ตรวจไม่พบระยะ trophozoite

รายละเอียดเบรี่ยนเพื่อบนผลการตรวจพบเชื้อ  
protozoa ระยะ trophozoite และ cyst โดยวิธี

Simple smear, วิธี Simple sedimentation และ  
วิธี Formalin-ether concentration แสดงไว้  
ในตารางที่ 1

ผลการตรวจพบไข่หนอนพยาธิชนิดต่าง ๆ ด้วย  
วิธีทั้ง 3 แสดงการเบรี่ยนเพื่อบนในตารางที่ 2 จาก  
ผลการศึกษาพบไข่หนอนพยาธิและตัวอ่อนหนอน  
พยาธิรวม 255 ราย ซึ่งตัวอ่อนหนอนพยาธิที่พบ  
ในการศึกษารังนี้มีเพียงชนิดเดียวคือตัวอ่อนของ  
หนอนพยาธิ *Strongyloides* ไข่พยาธิที่พบมากที่  
สุดคือ hook worm, *Opisthorchis* และตัวอ่อน  
ของหนอนพยาธิ *Strongyloides*

เมื่อนำข้อมูลการตรวจพบไข่ของหนอนพยาธิ  
ทั้งสามชนิดดังกล่าว (ตารางที่ 2) มาวิเคราะห์ค่า  
สถิติ Chi-square test สรุปผลได้ว่า

1. วิธี Simple sedimentation สามารถให้  
ผลจำนวนที่ตรวจพบ (ราย) สำหรับเชื้อปราสิตทั้ง  
(hook worm, *Opisthorchis* และตัวอ่อนของ  
หนอนพยาธิ *Strongyloides*) 3 ชนิด มากกว่าวิธี  
Simple smear อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

2. วิธี Formalin - ether concentration  
สามารถให้ผลจำนวนที่ตรวจพบ (ราย) สำหรับเชื้อ<sup>\*</sup>  
ปราสิตทั้ง 3 ชนิด ได้มากกว่าวิธี Simple smear  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

3. วิธี Formalin - ether concentration  
สามารถให้ผลจำนวนที่ตรวจพบ (ราย) สำหรับ  
*Opisthorchis egg* ได้มากกว่า วิธี Simple  
sedimentation อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) และสามารถให้ผลจำนวนที่ตรวจพบ (ราย)  
สำหรับ hookworm egg ได้มากกว่าวิธี Simple  
sedimentation อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.025$ ) แต่ สำหรับตัวอ่อนของหนอนพยาธิ *Strongy-  
loides* นั้น วิธี Simple sedimentation ให้ผล

**Table 1.** Comparative findings of protozoa by Simple smear, Simple sedimentation and Formalin-ether concentration technic.  
(Total number of positive cases = 30)

Parasites	Simple smear technic			Simple sedimentation technic			Formalin - ether concentration technic		
	No. of positive cases	%*	No. of positive cases	%*	No. of positive cases	%*	No. of positive cases	%*	
<i>Entamoeba coli</i> trophozoite	12	40	1	3.3	0	0.0	0	0.0	
<i>Entamoeba coli</i> cyst	11	36.7	15	50.0	15	50.0	0	0.0	
<i>Endolimax nana</i> trophozoite	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
<i>Endolimax nana</i> cyst	3	10.0	5	16.7	5	16.7	0	0.0	
<i>Trichomonas hominis</i>	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
<i>Giardia Lamblia</i> cyst	12	40.0	12	40.0	12	40.0	12	40.0	
<i>Iodamoeba butschlii</i> cyst	1	3.3	1	3.3	1	3.3	1	3.3	

note : - \*  $\frac{\text{No. of positive cases}}{\text{Total no. of positive cases ( = 30 )}}$   $\times 100$

- Some cases were positive for more than 1 species of protozoa.

Table 2. Comparative findings of helminth eggs by Simple smear, Simple sedimentation and Formalin-ether concentration technic. (Total number of positive cases = 255)

Parasites	Simple smear technic. (SS)		Simple sedimentation technic. (SSe)		Formalin-ether concentration technic. (FEC)		Chi-square test		
	No. of positive cases	%	No. of positive cases	%	No. of positive cases	%	SSe VS SS	FEC VS SS	FEC VS FEC
Ascaris lumbricoides	1	0.4	1	0.4	1	0.4	42.7	P < 0.05	P < 0.0025
Hook worm*	26	10.2	75	29.4	109	42.7	P < 0.05	P < 0.05	P < 0.05
Trichuris trichiura	1	0.4	4	1.6	10	3.9	P < 0.05	P < 0.05	P > 0.05
Strongyloides larvae*	14	5.5	41	16.1	52	20.4	P < 0.05	P < 0.05	P < 0.05
Echinostoma	0	0.0	2	0.8	3	1.2			
Fasciolopsis buski	0	0.0	1	0.4	1	0.4			
Opisthorchis*	41	16.1	88	34.5	107	42.0	P < 0.05	P < 0.05	P < 0.05
Taenia	1	0.4	2	0.8	2	0.8			

\* These worms found to be more common in this study. Therefore statistical analysis in detection of them between the methods were added.

จำนวนที่ตรวจพบ (ราย) ไม่แตกต่างจากการตรวจด้วยวิธี Formalin - ether concentration อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ )

การเปรียบเทียบสัดส่วนการตรวจพบไข่ของหนอนพยาธิชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธี Simple smear, วิธี Simple sedimentation และวิธี Formalin - ether concentration นั้นแสดงไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำนวนไข่ของหนอนพยาธิที่พบต่อ 1 สไลด์ หรือ smear จากการตรวจทั้ง 3 วิธี

เมื่อนำข้อมูลที่ได้ (ตารางที่ 4A) มาวิเคราะห์โดยใช้ t-test ชนิด one tailed test สรุปผลได้ว่า

1. วิธี Simple sedimentation สามารถตรวจพบไข่ของหนอนพยาธิได้จำนวนมากกว่าวิธี Simple smear อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.0005$ )

2. วิธี Formalin - ether concentration สามารถตรวจพบไข่ของหนอนพยาธิได้จำนวนมากกว่า Simple smear อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.0005$ )

3. วิธี Formalin - ether concentration สามารถตรวจพบไข่ของหนอนพยาธิได้จำนวนมากกว่า Simple sedimentation อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.025$ )

ผลจากตารางที่ 4 A สามารถนำมาเปรียบเทียบทาสัดส่วนค่าเฉลี่ยของไข่หนอนพยาธิที่ตรวจพบต่อสไลด์ หรือ smear จากการตรวจด้วยวิธีทั้ง 3 ได้ผล ดังนี้คือ

Simple smear : Simple sedimentation มีค่าเท่ากับ 1 : 8.6, Simple smear : Formalin - ether concentration มีค่าเท่ากับ 1 : 34.4 และ Simple sedimentation : Formalin - ether concentration มีค่าเท่ากับ 1 : 4.0

สำหรับค่าเฉลี่ยจำนวนตัวอ่อนของหนอนพยาธิ Strongyloides ที่พบต่อ 1 สไลด์ หรือ smear จากการตรวจด้วยวิธีทั้ง 3 แสดงเปรียบเทียบในตารางที่ 4 B

เมื่อนำข้อมูลที่ได้ (ตารางที่ 4B) มาวิเคราะห์โดยใช้ t-test ชนิด one tailed test สรุปผลได้ว่า

1. วิธี Simple sedimentation สามารถตรวจพบตัวอ่อนของหนอนพยาธิได้จำนวนมากกว่าวิธี Simple smear อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

2. วิธี Formalin - ether concentration สามารถตรวจพบตัวอ่อนของหนอนพยาธิได้จำนวนมากกว่าวิธี Simple smear อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

3. วิธี Simple sedimentation สามารถตรวจพบตัวอ่อนของหนอนพยาธิได้จำนวนไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากวิธี Formalin - ether concentration ( $P > 0.05$ )

นอกจากนี้ผลที่ได้จากตารางที่ 4 B สามารถนำมาเปรียบเทียบทาสัดส่วนค่าเฉลี่ยของตัวอ่อนของหนอนพยาธิที่ตรวจพบต่อสไลด์ หรือ smear จากการตรวจพบ ด้วยวิธีทั้ง 3 ดังนี้คือ

Simple smear : Simple sedimentation มีค่าเท่ากับ 1 : 9.2, Simple smear : Formalin - ether concentration มีค่าเท่ากับ 1 : 11.6 และ Simple sedimentation : Formalin - ether concentration มีค่าเท่ากับ 1 : 1.3

## วิจารณ์

ผลของการศึกษาปรากฏว่า Formalin - ether concentration เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจหาไข่ของหนอนพยาธิในอุจจาระโดยให้ผลจำนวนรายที่พบ และจำนวนไข่ของหนอนพยาธิที่

Table 3. Comparison of ratio of helminth eggs found by Simple smear, Simple sedimentation and Formalin-ether concentration technique.

Parasites	Simple smear technic (SS)		Simple sedimentation technic (SSe)		Formalin-ether concentration technic (FEC)	
	No. of eggs found*	No. of eggs found by SS.	No. of eggs found by SSe.	No. of eggs found by SSe.	No. of eggs found by FEC.	No. of eggs found by FEC.
		No. of eggs found by SSe		No. of eggs found by FEC.		
<i>Ascaris lumbricoides</i>	9	1 : 1.4	13	1 : 1.6	21	1 : 2.3
Hookworm	96	1 : 6.9	659	1 : 4.8	3195	1 : 33.3
<i>Trichuris trichiura</i>	2	1 : 6.0	12	1 : 5.7	68	1 : 34.0
<i>Strongyloides</i> Larvae	184	1 : 9.3	1713	1 : 1.3	2157	1 : 11.7
<i>Echinostoma</i>	0	-	2	1 : 27.5	55	-
<i>Fasciolopsis buski</i>	0	-	1	1 : 10	10	-
<i>Opisthorchis</i>	220	1 : 9.4	2071	1 : 3.7	7696	1 : 35.0
<i>Taenia</i>	4	1 : 6.8	27	1 : 2.3	61	1 : 15.3

\* Total number of helminth eggs found in each species by three methods.

**Table 4.** Comparative of mean number of helminth eggs and mean number of larvae per slide by Simple smear, Simple sedimentation and Formalin-ether concentration technic. (Total number of positive cases of helminth eggs = 202 and total number of positive cases of Strongyloides larvae = 53)

No.of	Simple smear technic (SS)	Simple sedimentation technic (SSe)	Formalin-ether concentration technic (FEC)	t-test (one tailed test)		
				SSe VS SS	FEC VS SS	FEC VS SSe
A.						
Total no. of eggs*	331	2785	11106	P < 0.0005	P < 0.0005	P < 0.025
Mean no. of eggs	1.6	13.8	55.0			
B.						
Total no. of larvae	18.4	1713	2157	P < 0.05	P < 0.05	P > 0.05
Mean no. of larvae	3.5	32.3	40.7			

\* Total number of helminth eggs which found in this study.

พบสูงกว่าการตรวจด้วยวิธี Simple sedimentation และวิธี Simple smear อよ่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงควรนำมาใช้ในการตรวจอุจจาระทุกครั้งเพื่อให้ได้ผลแน่นอนขึ้น<sup>(3)</sup>

ผลการตรวจพบเชื้อ protozoa ใน การศึกษา นี้ไม่ได้รายงานเปรียบเทียบค่าสถิติไว้ เนื่องจากไม่สามารถรายงานผลการตรวจพบบรรณะ cyst ของ protozoa เป็นค่าตัวเลขที่แน่นอนได้ เพราะอุจจาระผู้ป่วยที่มีเชื้อ protozoa นั้น ต่างก็มีมากกว่า 100 cyst ต่อสไลด์ อย่างไรก็ตามสำาจะเปรียบเทียบคุณจากความหนาแน่นของเชื้อต่อสไลด์จะพบว่า วิธี Simple sedimentation สามารถตรวจพบจำนวน cyst ได้มากกว่าวิธี Simple smear ประมาณ 3 เท่า และวิธี Formalin - ether concentration สามารถตรวจพบจำนวน cyst ได้มากกว่าวิธี Simple smear ประมาณ 5 เท่า ซึ่งผลที่ได้นี้ ได้ผลจากผู้ตรวจคนเดียวกันทั้ง 3 วิธี ตลอดการศึกษาปัญหาเรื่องการอ่านผลแตกต่างกันจึงไม่มี แต่เมื่อพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลการตรวจพบ protozoa (ตารางที่ 1) จะพบว่า จำนวนตรวจพบ (ราย) ของระยะ cyst ด้วยการตรวจโดยวิธีทั้ง 3 นั้น ไม่แตกต่างกันมากนัก ผลอันนี้จึงไม่อาจนับว่าสมบูรณ์ เนื่องจากจำนวนตรวจพบ (ราย) สำาหรับเชื้อ protozoa ใน การรายงานครั้งนี้ยังไม่เพียงพอคือมีจำนวนหั้งหมดเพียง 30 รายเท่านั้น และแต่ละรายที่ตรวจพบเชื้อ protozoa ระยะ cyst ส่วนแต่เมื่อจำนวน cyst มากmany ในอุจจาระดังนั้นจึงสามารถตรวจพบได้จากทั้ง 3 วิธีดังกล่าวแล้ว

จากการเปรียบเทียบผลการตรวจอุจจาระ 3 วิธีในการศึกษาครั้งนี้ พนวิธี Simple sedimentation เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ไม่สิ้นเปลือง และใช้เวลาไม่นาน (15 นาที) เมื่อนำเข้ามูล (ตารางที่ 4 A) มาเปรียบเทียบหาสัดส่วนค่าเฉลี่ยของไปท่อนอนพยาธิที่ตรวจพบต่อสไลด์จากการตรวจด้วยวิธีทั้ง 3 ผล

ที่ได้คือ วิธี Simple sedimentation สามารถตรวจพบเป็น 8.6 เท่าของวิธี Simple smear แต่เมื่อเทียบผลกับวิธี Formalin - ether concentration ตรวจพบได้น้อยกว่าวิธีหลังนี้ 4 เท่า ส่วนในการตรวจหาตัวอ่อนของหนอนพยาธิ *Strongyloides* นั้น เมื่อนำเข้ามูล (ตารางที่ 4 B) มาเปรียบเทียบหาสัดส่วนค่าเฉลี่ยของตัวอ่อนของหนอนพยาธิ *Strongyloides* ที่ตรวจพบต่อสไลด์ จากการตรวจด้วยวิธีทั้ง 3 พนวิธี simple sedimentation สามารถตรวจพบได้เป็น 9.2 เท่าของผลที่ได้จากวิธี Simple smear และสามารถตรวจพบได้จำนวนไม่แตกต่าง อよ่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากวิธี Formalin - ether concentration ( $P > 0.05$ ) ทั้งนี้อาจเนื่องจากตัวอ่อนของหนอนพยาธิอาจหลุดไปกับขั้นตอนการกรองของวิธี Formalin - ether concentration ดังได้เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการตรวจอุจจาระด้วยวิธี Centrifugal sedimentation นั้น ไปท่อนอนพยาธิอาจถูกแยกออกไปบ้างโดยการกรอง แต่การกรองอาจหากอุจจาระออกไปก็ช่วยให้การตรวจพบเชื้อปรารถิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งนับว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย<sup>(11)</sup>

จากการศึกษานี้จึงเห็นว่าวิธี Simple sedimentation เป็นวิธีทำให้เข้มข้นที่น่าจะนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีงบประมาณพอที่จะทำวิธี Formalin - ether concentration โดยทำควบคู่ไปกับวิธี Simple smear เพื่อให้ได้ผลถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้น เนื่องจากการตรวจอุจจาระและรายงานผลโดยวิธี Simple smear เพียงวิธีเดียว นั้น อาจมีการผิดพลาดได้ เพราะวิธีดังกล่าวนี้จะตรวจได้ผลแน่นอนเมื่อมีไปพยาธิเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 500 ใบต่ออุจจาระหนึ่งกรัม<sup>(12)</sup>

อนึ่งในการตรวจอุจจาระผู้ป่วยที่สงสัยโรคติดเชื้อทางปรารถิต การตรวจอุจจาระและไม่พบปรารถิต

เพียงครั้งเดียวจะสรุปผลไม่ได้ ควรตรวจซ้ำอย่างน้อย 5 ครั้ง และใช้วิธีทำให้เข้มข้นทุกครั้ง สำาอุจจาระมีลักษณะเหลวซึ่งอาจมีระยะ trophozoite ของ amoeba หรือ *Trichomonas hominis* ไม่ควรใช้วิธีทำให้เข้มข้น แม้ว่าผลจากการศึกษาครั้งนี้ตรวจพบระยะ trophozoite ของ *E. coli* 1 รายโดยวิธี Simple sedimentation ก็ตาม เพราะการวินิจฉัยที่แน่นอนจำเป็นต้องดูการเคลื่อนไหวของเชื้อและถ้าเป็นไปได้ควรดูทันทีที่อุจจาระส่งถึงห้องปฏิบัติการ แต่การตรวจด้วยวิธี simple sedimentation ต้องตั้งติ้งไว้ 15 นาที เพื่อให้เชื้อปรารถติดต่อกันก่อนตรวจ ทำให้การเคลื่อนไหวของเชื้อ protozoa เปลี่ยนแปลงไปยกแก่การวินิจฉัย นอกจากนี้วิธีเข้มข้นจะทำให้ trophozoite ตายระหว่างกระบวนการก่อนตรวจ<sup>(3)</sup> ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนเหตุผลดังกล่าว เพราะปรากฏว่าตรวจไม่พบระยะ trophozoite โดยวิธี Formalin - ether concentration ดังนั้นวิธีธรรมดاجึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจหาระยะ trophozoite ของ protozoa.

## อ้างอิง

1. Suzuki N. Color Atlas of Human Helminth Eggs. 2 ed. JAPC and JOICFP. Hoken, Kaikan, 1 - 2 Ichigaya Sadohara-Cho, Shinjuku, Tokyo : Japan, 1977. 1-95
2. Marwi M.A. Comparative efficiency of methods commonly used for diagnosis of soil-transmitted helminths. A thesis submitted to the Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, 1979.
3. กำพล เพชรานันท์, ชาครี จันดนาวงศ์, เกศิน จันทชุม, เพ็ญญา อัครบวร, วชรชัย ปานอ่า, สุทธิน พิมพ์ช์. การศึกษาเบรี่ยนเทียบผลการตรวจอุจจาระด้วยวิธีธรรมดากับวิธี Formalin-ether

## สรุป

รายงานผลการเบรี่ยนเทียบการตรวจอุจจาระ 323 ราย ด้วยวิธี Simple smear, Simple sedimentation และวิธี Formalin - ether concentration ผลปรากฏว่าวิธี Simple smear ให้ผลดีในการตรวจหาระยะ trophozoite ของ protozoa วิธี Simple sedimentation ให้ผลดีกว่าวิธี Simple smear ใน การตรวจหาไข่หนอนพยาธิและตัวอ่อนของหนอนพยาธิ *Strongyloides* อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.0005$  และ  $P < 0.05$  ตามลำดับ) วิธี Formalin - ether concentration ให้ผลดีกว่า วิธี Simple sedimentation ใน การตรวจหาไข่หนอนพยาธิอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.025$ ) ส่วนตัวอ่อนของหนอนพยาธิ *Strongyloides* นั้น การตรวจหาโดยวิธี Simple sedimentation หรือวิธี Formalin - ether concentration ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ )

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้รายงานขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสัย ภรรยาเวช ที่สนับสนุนการศึกษานี้

concentration. อุทาลงกรณ์เวชสาร 2519

มกราคม ; 20 (1) : 259-262

4. Ritchie L.S. An ether sedimentation technique for routine stool examination. Bull U.S. Army Med Dept 1948 ; 8 : 326-331
5. Chularerk U, Clearanai S, Tongkoom B. Parasitoses in a northern rural community of Thailand, a study on prevalence, ecology, and mass treatment. J Parasit Trop Med Assoc Thai 1973 Jan ; 4 (1) : 5-14
6. Keittivui B, Surote P, Supasen Y. Prevalence of the intestinal Parasitic infection in the slum area of Bangkok

- kok, Thailand with comments on Pyrantel pamoate efficacy against helminthic infections. J Parasit Trop Med Assoc Thai 1978 Jan; 2 (1) : 39-53
7. Papasarathorn T, Chularerk U. Studies on intestinal parasitic infections and masstreatment by "Piperazine adipate" in Nondburi Area. J Med Assoc Thai 1960 Sept ; 43 (5) : 572-577
8. Papasarathorn T, Chularerk P, Chularerk U. Study on ecology and prevalence of intestinal parasites with special reference to the intensity of human hookworm infections and opisthorchiasis in health development area, Bantard, Udorn Province. J Med Assoc Thai 1967 June ; 50 (6) : 423-431
9. Papasarathorn T, Chularerk P, Chularerk U. Viboolyavatana J, Kiartivuti A Hyperendemicity of intestinal parasitoses in the population of Tambol Dongjen, Amphur Payoa, Chiengrai Province with special reference to epidemiology of ascariasis. J Med Assoc Thai 1969 Apr ; 52 (4) : 311-323
10. Ritchie L S, Pan C, Hunter G W. A comparison of the zinc sulfate and the MGL (formalin-ether) technic. J Parasitol 1952 ; 38 Suppl : 16
11. Faust E C, Sawitz W, Tobie J, Odom V, Peres C and Lincicome DR. Comparative efficiency of various technics for the diagnosis of protozoa and helminth eggs in feces. J Parasitol 1939 Jun ; 25 : 241-262
12. Hansheer W C and Herrick CA. The place of the smear in hookworm diagnosis. Am J Hyg 1926 July; 6 Suppl : 136-148

จุฬาลงกรณ์เวชสารได้รับต้นฉบับเมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2528