

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาวิธีทดสอบแบบแผ่นปะในผู้ป่วยแอลเลอจิก คอนแท็คท์ เดอร์มาไติติส**

วัฒนศรี สินธุก้า*
วิวัฒน์ ก่อภิจ*

Sindhupak W, Korkij W. A study of the patch test in patients with contact dermatitis. Chula Med J 1988 Feb; 32 (2) : 121-127

Patch tests were performed on 190 cases of suspected allergic contact dermatitis, at the out-patient skin clinic Chulalongkorn Hospital. The allergens were from the European Standard Tray with 20 substances in soft yellow paraffin. Only patients with no active lesion participated in this study. Sixty four patients showed positive tests to one or more allergens (33.68%). Fragrance Mix was the highest positive substance.

The relationships between the contact sites, the suspected substances and the positive allergens are shown and discussed.

Reprint requests : Sindhupak W, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10500, Thailand.

Received for publication. May 22, 1987.

*ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .

**การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ปี พ.ศ. 2524

Contact dermatitis คือ การอักเสบของผิวนังซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับสารที่เป็นตัวต้นเหตุ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ Irritant contact dermatitis และ allergic contact dermatitis

1. Irritant contact dermatitis หมายถึงการอักเสบของผิวนังซึ่งเกิดเป็นผลโดยตรงจากสารที่มาสัมผัส เช่น กรด, ด่าง, สารเคมีต่าง ๆ เกิดได้กับบุคคลทั่ว ๆ ไป อาการหรืออาการแสดงที่เกิดอาจเป็นได้ตั้งแต่ความรู้สึกระคายเคืองไม่มีผื่นที่ผิวนัง มีผื่นแดง มีผื่นอักเสบแบบ eczema มีผื่นคุ่มหนองซึ่งแตกเป็นแผล รูขุมขนอักเสบและผอมร่วงผื่นแบบลมพิษ ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงสีของผิวนัง การวินิจฉัยใช้จากการซักประวัติและคุลักษณะผื่น

2. Allergic contact dermatitis ได้แก่ การอักเสบของผิวนัง ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับสารที่เป็น allergen ซึ่งคือสารที่จะทำให้เกิดการแพ้ในบางคนเท่านั้น อาการและอาการแสดงที่เกิดเป็นผลจากปฏิกิริยาการแพ้ชนิดที่ 4 (Type IV Hypersensitivity) ลักษณะผื่นที่เกิดมักเป็นการอักเสบแบบ eczema ผื่นแบบลมพิษ ผื่นแบบ granuloma และ ผื่นแบบ erythema multiforme⁽¹⁾ การวินิจฉัยเพื่อตรวจหาชนิดของสารที่ทำให้เกิดอาการเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการรักษาและป้องกัน วิธีการที่ใช้คือการทำ Patch test หลักการคือ นำสารที่สงสัยว่าจะแพ้จำนวนเล็กน้อยและความเข้มข้นตามสัมผัสนิปปอนงส่วนที่ดีของผู้ป่วย สำผู้ป่วยแพ้สารนั้น จะเกิดปฏิกิริยาการอักเสบของผิวนังในบริเวณนั้น ในเวลา 24-96 ชั่วโมง

การวินิจฉัยต้องการทำการทดสอบ patch test ในผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อหาอุบัติการของสารที่แพ้ จะได้เป็นประโยชน์ในการสืบหาสิ่งที่ผู้ป่วยสัมผัสในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ๆ ต่อไป

วัสดุและวิธีการ

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยหรือสงสัยว่าเป็น allergic contact dermatitis ที่มาตรวจที่หน่วยศิริแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยมีประวัติสัมผัสกับสารต่าง ๆ และมีผื่นส่วนใหญ่เป็นแบบ acute eczema ก่อนทำ Patch test จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดพร้อมทั้งให้การรักษาผื่นอักเสบของผิวนังแล้วทุกราย

Patch test allergen ที่ใช้เป็นของ European standard tray ของบริษัท K-Trolle-Harsen-Hoyrups, Denmark ซึ่งมีสารทั้งหมด 20 ชนิด ผสมใน soft yellow paraffin ยกเว้น formaldehyde ผสมในน้ำ ส่วนแผ่น

ที่ใช้ปิดได้แก่ Al-test ของบริษัท Imeco, Astra Agency, Sweden ซึ่งประกอบด้วย Cellulose disc ปิดแน่นบนกระดาษอะลูมิเนียมชิ้นสีเหลืองซึ่งしばด้วย polyethylene และยึดติดกับผิวนังผู้ป่วยโดย Hypoallergenic tape เช่น Blenderm หรือ micropore อีกทีหนึ่ง

ตำแหน่งที่ทำการทดสอบ ใช้หลังผู้ป่วย เนื่องจากเป็นบริเวณที่ดีที่สุด โดยทำความสะอาดด้วย 70% alcohol และปิด Al-test ซึ่งหยดน้ำยาต่าง ๆ ทั้ง 20 ชนิด และ control ลงบนหลังผู้ป่วย นัดเปิดและอ่านผลในวันที่ 2 และ 4 หลังจากวันที่ทำ

เมื่อเปิด test patch ออกแล้วรอ 30 นาทีจึงอ่านผล เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการกดของ plaster

สำหรับการอ่านผล ได้แบ่ง grade ออกเป็น 5 grade ตาม North American Contact Dermatitis group คือ

Neg	= No reaction.
±	= Doubtful reaction : faints, macular erythema.
+	= Weak (non vesicular) positive reaction : erythema & papules.
++	= Strong (vesicular) positive reaction : erythema, papules, vesicles.
+++	= Extreme positive reaction : all of the foregoing plus large vesicle, bullae & ulceration.

แต่การแบ่งผลนั้นจะคิดเพียงแต่ Positive & negative ดังนี้

1+ ถึง 3+ ซึ่งอยู่นานถึง 48-72 ชั่วโมง เป็น Positive⁽²⁾

neg ถึง 1+ ซึ่งอยู่นาน 24 ชั่วโมง เป็น Negative

ผลการทดลอง

ผู้ป่วยเข้ารับการทำ Patch test ทั้งหมด 190 คน เป็นชาย 57 คน (30%) หญิง 133 คน (70%) ตำแหน่งของผื่นในผู้ป่วยที่เข้ารับการทดสอบ ได้แสดงใน Table 1 โดยแบ่งออกเป็น 5 ตำแหน่งด้วยกัน ได้แก่

ผื่นที่หน้า รวมตั้งแต่ศีรษะ หน้า ใบหน้า คอ

ผื่นที่ดัว เริ่มจากคอ หน้าอก ท้อง หลัง ก้น ต้นแขน ขาอ่อน หน้าแข็งและน่อง

ผื่นที่มือ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อจากข้อมือ ถึงปลายนิ้วมือ ทั้ง 2 ข้าง

ผื่นที่เท้า ตั้งแต่ข้อเท้าลงไปถึงหลังเท้า และฝ่าเท้า

ผู้ที่มีอ่อนแพ้เท้า คือ มีทั้งผื่นที่มีอ่อนแพ้เท้า ดังกล่าว
พบว่าในผู้ป่วยที่เข้าทำการทดสอบทั้งหมด มีผื่นมาก
ที่สุดที่เท้า รองลงมาเป็นที่มือ ตัว หน้า มีอ่อนแพ้ตาม

ลำดับ แต่ถ้าถูกความเพลเส้น หญิงมีผื่นมากที่สุดที่เท้า (39.10%)
ขณะที่ชาย มีผื่นมากที่สุดที่ตัว (33.32%) และมีอ่อนแพ้ทั้ง 2 เท้า
รองลงมาในทั้ง 2 เพศ

Table 1 Shows the distribution of skin lesion in tested patients.

Patients	Location of skin lesion						
	Face %	Trunk %	Hands %	Feet %	Hands % & Feet		
Male 57	6	10.53	19	33.33	17	29.88	10 17.54
Female 133	18	13.53	24	18.05	37	27.82	52 39.10
Total 190	24	12.63	43	22.63	54	28.42	62 32.63
							7 3.68

สำหรับสิ่งที่ผู้ป่วยสัมผัสในชีวิตประจำวันและสงสัย
ว่าจะแพ้ ได้แสดงใน Table 2 สิ่งที่ผู้ป่วยสงสัยว่าจะแพ้

มากที่สุด ได้แก่ เครื่องหนัง หัวรองเท้า ถุงมือ และอื่น ๆ
รองลงมาคือ ผงซักฟอก

Table 2 Shows the suspected contact substances in the tested patients.

Skin lesion on face 24	Skin lesion on trunk 43	Skin lesion on hands 54	Skin lesion on feet 62	Skin lesion on hands & feet 7
Suspected substance Pt.				
Cosmetic 6	Cutting oil 7	Detergent 7	Leather shoes 3	Leather 3
Tooth paste 4	Watch band 6	Cement 6	Detergent 5	Unknown 4
Lipstick 3	Elastic band 4	Leather groves 4	Rubber shoes 4	
Earrings 3	Topical cream 4	Watch band 4	Plaster 3	
Hair dye 3	Metal hook of brasier 4	Hair dye 1	Sock 2	
Topical cream 2	Detergent 3	Unknown 32	Carpet 1	
Unknown 3	Necklace 3		Unknown 34	
	Unknown 12			

ในผู้ป่วยทั้ง 190 คน ผู้ป่วยที่ให้ผล positive
ต่อสารที่ทดสอบตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป 64 คน คิดเป็น
(33.68%) เป็นหญิง 45 คน (70.31%) และชาย 19 คน
(29.69%) ไม่พบว่ามีผล positive ต่อ control เลย และ
ทั้ง 64 คนเน้นพบร่วม

ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มที่มีผื่นที่หน้า 8 ราย (12.5%)
" " ตัว 14 ราย (21.88%)
" " มือ 18 ราย (28.12%)
" " เท้า 21 ราย (32.81%)
" " มือและเท้า 3 ราย (4.69%)

ในจำนวน 8 รายของผื่นที่หน้า พบร่วมสงสัยว่าแพ้
เครื่องสำอาง 2 ราย สิฟสติก 1 ราย ยาทา 1 ราย
ยาสีฟัน 1 ราย และไม่ทราบ 3 ราย

ในกลุ่มผื่นที่ตัว 14 ราย สงสัยว่าแพ้ สายนาฬิกา 3 ราย
ยางรัดข้อมือกางเกง 1 ราย ขอເສື້ອຂັ້ນໃນ 1 ราย

ผงซักฟอก 3 ราย สร้อยคอ 1 ราย ไม่ทราบ 5 ราย
ในกลุ่มที่มีผื่นที่มือ สงสัยว่าแพ้ผงซักฟอก 6 ราย
บุนชีเมนต์ 2 ราย ถุงมือหนัง 1 ราย สายนาฬิกา 3 ราย
ไม่ทราบ 6 ราย

ในกลุ่มผื่นที่เท้า สงสัยว่าแพ้รองเท้าหนัง 5 ราย
ผงซักฟอก 3 ราย รองเท้ายาง 2 ราย ไม่ทราบ 11 ราย
ในกลุ่มผื่นที่มีอ่อนแพ้เท้า ไม่ทราบว่าแพ้อะไรทั้งหมด
3 ราย

ในทั้ง 5 กลุ่มนี้ผู้ป่วยที่ไม่ทราบว่าแพ้อะไรมี 28
ราย คิดเป็น 43.75%

ในสารที่ใช้ทดสอบทั้งหมด 20 ตัว พบร่วมให้ผล
positive ทุกตัว ซึ่งจำนวนมากน้อยได้แสดงในตารางที่ 3
จำนวนผลที่ positive ทั้งหมดมี 173 ราย ซึ่งเฉลี่ยแล้ว
ผู้ป่วยแต่คนจะให้ผล positive ต่อสารที่ใช้ทดสอบประมาณ
2.7 ชนิดต่อคน

Table 3 Shows the number of positive tested allergens.

Allergen	Face	Trunk	Hands	Feet	Hands & Feet	Total	% (N=64)
1. Fragrance Mix	5	6	9	9	1	30	46.87
2. Dichromate	1	3	4	7	1	16	25
3. Nickel	1	6	5	2	—	14	21.87
4. Cobalt	2	4	2	3	—	11	17.19
5. Wood tar	1	4	3	3	—	11	17.19
6. Neomycin	2	3	1	2	1	9	14.06
7. Balsum of Peru	1	2	2	3	1	9	14.06
8. Ethylene diamine	1	4	2	2	—	9	14.06
9. Paraben	—	2	2	4	—	8	12.50
10. Colophony	2	1	2	3	—	8	12.50
11. Carbo mix	1	1	2	3	—	8	12.50
12. Formaldehyde	—	—	3	3	—	6	9.37
13. Epoxy resin	1	—	2	3	—	6	9.37
14. Naphthyl mix	1	1	2	2	—	6	9.37
15. Thiuram mix	—	—	2	3	—	5	7.81
16. P.P.D. mix	—	1	1	3	—	5	7.81
17. P.P.D.	—	1	3	—	—	4	6.25
18. Mercapto mix	1	1	2	—	—	4	6.25
19. Chinoform	1	—	1	1	—	3	4.68
20. Wool alcohol	1	—	—	1	—	2	3.13
21. Control (Petrolatum)	—	—	—	—	—	0	0

ส่วนสารที่พบว่าแพ้กันมากที่สุด 5 ชนิดแรกได้แก่ Fragrance mixed, Dichromate, Nickel, Cobalt และ Wood tar

เมื่อแยกตามตำแหน่งของผู้ที่พบว่าสารที่แพ้มากที่สุด ได้แก่ Fragrance mixed (Table 4)

Table 4 Shows the most common positive substances, according to the location of the lesions.

Face (8)			Trunk (14)			Hands (18)			Feet (21)			Hands & Feet (3)		
Allergens	No. of +ve	%	Allergens	No. of +ve	%	Allergens	No. of +ve	%	Allergens	No. of +ve	%	Allergens	No. of +ve	%
Fragrance	5	62.5	Fragrance	6	42.8	Fragrance	9	50	Fragrance	9	42.9	Dichromate	1	33.3
Dichromate	1	12.5	Nickel	6	42.9	Nickel	7	27.8	Dichromate	7	33.3	Fragrance	1	33.3
Carbo-mixed	1	12.5	Cobalt	4	28.6	Dichromate	4	22.2	Paraben	4	19	Neomycin	1	33.3

ส่วนที่เก้า สารที่พบรอง ๆ ลงมา ได้แก่ dichromate, paraben

มือ สารที่พบรอง ๆ ลงมา ได้แก่ nickel, dichromate

ตัว พนว่าแพ้ Nickel เท่ากับ fragrance รองลงมาเป็น cobalt

หน้า ตัวที่พบรอง ๆ ลงมาได้แก่ dichromate ซึ่งพบเท่ากับ carba mixed

มือและเท้า พนว่าแพ้ dichromate & neomycin เท่ากับ fragrance

วิจารณ์

การทำ Patch test เป็นวิธีการที่ดีในการช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค contact dermatitis และเป็นการตรวจหาชนิดของสารที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดการแพ้ด้วย นอกจากนี้ยังอาจมีประโยชน์ในการตรวจหาสาเหตุของโรค chronic unexplained eczematous eruption

วิธีการนี้ทำการทดสอบและทราบผลได้ในผู้ป่วยแต่ละคน ปลอดภัยกว่าการทำ Use test เพราะใช้ขนาดความเข้มข้นของสารต่างๆ บนผิวหนังจำนวนเล็กๆ ในระยะเวลาสั้นๆ

ในรายงานนี้ได้ทดลองทำ Patch test ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น allergic contact dermatitis ทั้งหมด 190 ราย เป็นผู้ป่วยที่ให้ผลการทดสอบ positive 64 ราย คิดเป็น 33.68% ใกล้เคียงกับรายงานอื่นๆ^(3,4,5) ในรายงานนี้พยายามคัดเลือกเฉพาะผู้ที่สงสัยว่าจะเป็น allergic contact dermatitis จริงๆ เท่านั้น ไม่ได้นำผู้ป่วยที่เป็นโรคคันอักเสบที่ผิวหนังอื่นๆ มาทดสอบด้วย จำนวนของผู้ป่วยจึงค่อนข้างจะน้อย สำหรับการกระจายของผู้ป่วยพบว่าเป็นหญิง : ชาย 2.37 : 1 ซึ่งคิดว่าจะเป็นจากว่าผู้หญิงมีโอกาสสัมผัสกับสารต่างๆ มากกว่าผู้ชาย มากกว่าที่จะเกิดจากว่าผู้หญิง sensitive กว่าผู้ชาย

ตำแหน่งที่เกิดคัน พบว่าเป็นที่เท้ามากที่สุด รองลงมาคือที่มือ และลำตัว สำหรับสารที่ผู้ป่วยสัมผัสในชีวิตประจำวันและสองสิ่ย่าวแพ้ ผู้ป่วยบอกได้เพียง 81 รายของทั้งหมดคิดเป็น 50.94% และเมื่อแยกตามตำแหน่งที่เกิดคันแล้ว พบว่า (Table 2) กลุ่มที่มีผื่นที่หน้า สงสัยว่าจะแพ้เครื่องสำอางมากที่สุด ในกลุ่มที่มีผื่นที่ตัว แพ้น้ำมันเครื่องยนต์มากที่สุด กลุ่มที่มีผื่นที่มือ สงสัยว่าแพ้ปูนซีเมนต์มากที่สุด กลุ่มที่มีผื่นที่เท้า สงสัยว่าแพ้รองเท้าหนังมากที่สุด กลุ่มที่มีผื่นที่มือและเท้า แพ้เครื่องหนังมากที่สุด สำหรับสารทั้ง 20 ชนิดที่ใช้ทดสอบ พบว่า (Table 3) Fragrance mix เป็นสารที่พบว่าแพ้กันมากที่สุด 46.54% Dichromate รองลงมา 23.90% Nickel รองลงมา 22.01% Cobalt 18.87% และ Wood tar 16.98% และเมื่อแยกตามตำแหน่งผื่นแล้ว Fragrance mix ซึ่งเป็นตัวที่พบว่าแพ้มากที่สุด ยกเว้นในกลุ่มที่มีผื่นตามตัว พบว่าแพ้ Nickel มากที่สุด

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสารที่ทำให้เกิดการแพ้กับสิ่งต่างๆ ที่ผู้ป่วยใช้ในชีวิตประจำวันนั้น (Table 4) พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีผื่นที่หน้า ซึ่งแพ้เครื่องสำอางกันมากพบว่าแพ้ Fragrance mix มากที่สุด ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ เพราะ Fragrance mix เป็นส่วนประกอบของ cinnamic alcohol, cinnamic aldehyde, eugenol, isoeugenol, hydroxycitonella, oakmoss absolute, geraniol และ alpha-amyl cinnamic alcohol ความเข้มข้น 2% ใน petrolatum การแพ้ Fragrance mix จะเป็นตัวบอกถึง Fragrance sensitivity ได้ 70-80%

แต่ในอีก 20-30% จะ detect ไม่ได้ การแพ้ Fragrance ส่วนใหญ่มักจะออกมาในรูปของ allergic contact dermatitis อย่างอื่นๆ อาจพบได้บ้างเช่น photodermatitis, contact urticaria irritation & depigmentation Fragrance พบได้มากทั่วไปไม่เฉพาะในเครื่องสำอางเท่านั้นยังพบได้ในผงซักฟอก, น้ำยาที่ทำให้ผ้านุ่ม, ยาสีฟัน, และผ้าอนามัย

ในเครื่องสำอาง สารที่จะแพ้ได้มากที่สุด คือ Fragrance⁽⁷⁾, รองลงมาคือ preservative เช่น Quaternium-15, imidazolidinyl urea และ 2-bromo-2-nitropropane-1,3-dial และตัวที่สามคือ Lanolins & derivative

ในกลุ่มผื่นที่ตัวซึ่งสารที่ผู้ป่วยสงสัยว่าจะแพ้เป็นสาหร่ายพิกและผงซักฟอก สารที่พบบ่อยแพ้มากจากการ test คือ Fragrance และ Nickel การที่มีการใช้ Fragrance ในเครื่องใช้ต่างๆ แม้แต่ในยาทา เช่น Mycolog cream⁽⁶⁾ ร่วมกับการใช้น้ำหอมหลังโภนหนวด หรือใช้ยาระงับกันลิ้นตัวต่างๆ ทานผิวหนังที่อักเสบ หรือหลังโภนหนวดหรือรักแร้ที่มีการอักเสบ ทำให้ fragrance มีโอกาสกระตุนร่างกายทำให้เกิดการแพ้ได้มากขึ้น

ส่วน Nickel เป็นโลหะสีเงิน ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดได้มาก ใช้ผสมกับโลหะอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มความแข็ง โดยเฉพาะพวกโลหะมีค่าและ stainless steel Nickel เป็นสาเหตุที่สำคัญมากของ contact dermatitis โดยเฉพาะในผู้หญิง และเป็นโลหะที่ทำให้เกิดการแพ้มากที่สุด ผู้ชายอาจได้รับ Nickel sensitized จากโรงงานอุตสาหกรรมในคนทั่วไป อาจสัมผัสกับ nickel ได้ตั้งแต่ต้นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนกลางคืน ตำแหน่งที่พบมากที่สุด ที่ (จากตุ่มหยด), ท้านา (ขลิบของ pantyhose) ส่วนประกอบของเสื้อผ้าที่เป็นโลหะ เช่น กระดุม, ตะขอ, หัวเข็มขัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบได้ในอาหารต่างๆ หลายชนิด พบว่า 1-10% ของ nickel ในอาหารสูงคุณค่าทางระบบทางเดินอาหารและไม่สูงขับถ่ายออก ผู้ที่เกิดจากการแพ้ nickel นั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม⁽⁸⁾ คือ 1. บริเวณที่มีการสัมผัสถกับสารที่มี nickel โดยตรง มากเห็นลักษณะเป็นแบบ papular eczematous lesion 2. บริเวณอื่นที่ไม่ได้สัมผัสถกับสารโดยตรงซึ่งมักเกิดเป็นเท่าๆ กันทั้ง 2 ข้าง ลักษณะเป็น autosensitive hematogenous spreads เมื่อฉีดวัว “id” eruption มือที่มีเหื่อออกอยู่เมื่อไปสัมผัสถกับสารที่มี nickel หรือกำไลข้อมือ หรือสร้อยคอที่ทำด้วย nickel อาจทำให้เกิดอาการอักเสบในส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่ไม่ได้สัมผัสถกับ nickel ได้⁽¹⁾ พบว่า chloride ในเหื่อสามารถ

จะละลาย nickel ซึ่งอยู่ในโลหะออกม่าได้⁽⁹⁾ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเกิดผื่นคือการเสียดสีและการกด สำหรับสีเหล็กเลี่ยง สิ่งทั้ง 2 นี้ได้ อาจไม่เกิดผื่นอักเสบในคนที่แพ้ nickel⁽¹⁾

ในกลุ่มผื่นที่มีอ สารที่สงสัยว่าจะแพ้มากคือ ผงซักฟอกและสบายน้ำยา ส่วนสารที่พบว่าแพ้มากได้แก่ Fragrance เช่นกัน, รองลงมาเป็น Nickel & Dichromate ตามลำดับ

ในโรงงานอุตสาหกรรม chromium เป็น potent sensitizer ทำให้เกิดได้ทั้ง primary irritant corrosive effect ต่อ skin และ allergic contact dermatitis และในประเทศไทยที่ไม่ใช่เกิดแบบ allergic มากกว่า chromate พนได้ในผงซักฟอก bleaching agent, น้ำยาและครีมโภนหนวด, เครื่องหนัง, หัวไม้เข็ม, สี paint สีเหลืองและส้ม, hide glue⁽¹⁰⁾ & chromate catgut⁽¹¹⁾

ในเครื่องหนัง chrome-tanning ใช้กับหนังที่บางและเป็นสีห่อหุ้ม เช่น รองเท้า, เสื้อกั๊ก, ใน bleaching agent ใส่ chrome ลงไปเพื่อเป็น coloring และ stabilizing agent ก็จะทำให้เกิด dermatitis ในคนที่ sensitive ได้⁽¹²⁾ ถ้ามีเม็ดห่อหุ้มและขับถูกหัวไม้เข็มที่ไม่ได้ดูดไฟ และมี chromate เล็กน้อย เห็นอาจจะละลาย chromate ออกมายังหัวไม้เข็มได้⁽¹³⁾ ขณะเดียวกันเปลวไฟและครวนไฟจากหัวไม้เข็มมี chromate อยู่ด้วย รวมทั้งกลักไม้เข็มซึ่งใช้ดูดไฟแล้วก็อาจมี chromate อยู่จำนวนเล็กน้อย ซึ่งถ้าใส่ในกระเบ้าเสื้อผ้า ก็จะทำให้ส่วนนั้นเปื้อน chromate และอาจส่งต่อไปยังผิวหนังได้⁽¹⁴⁾

พลาฟอกฟอกที่มี phosphate อยู่จะมี chromium salt อยู่ด้วย ซึ่งจะเกิด dermatitis จาก chrome ได้⁽¹⁵⁾

Main sensitizer ในซีเมนต์ที่เป็น dichromate แต่อาจมี Nickel & Cobalt อยู่ด้วย ซีเมนต์จะได้รับ

chromium compound บ่นเข้าไปในขณะผลิต⁽¹⁶⁾

สำหรับสารตัวที่ 4 ที่พบว่าแพ้มากจากการทดสอบผู้ป่วยทั้งหมด ได้แก่ cobalt ซึ่งเป็นโลหะสีเทาเงิน เป็นรากใช้มากในพวง alloy เพื่อทำให้พวงสำหรับชามกระเบื้องและกระเบื้องเคลือบออกสีฟ้า ๆ แหล่งที่จะ expose ต่อ cobalt ได้มาก ได้แก่ nickelplated objects, vitamin B12

การแพ้ cobalt พบรากในประเทศไทยมากกว่า สหรัฐอเมริกา อาจเป็น เพราะมีสาร cobalt อยู่ในผงซักฟอก และซีเมนต์ของประเทศไทย จึงสามารถทำให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้มาก ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นได้ตัดสาร cobalt ออกจาก การทดสอบมาตรฐาน เนื่องจากพบรากการแพ้น้อยมากหรือไม่พบเลย⁽¹⁾ ในคนใช้ที่แพ้ vitamin B12 ซึ่งมี cobalt ผสมอยู่ด้วย พบรากให้ผลลบก่อต่อการทำ patch test ด้วย cobalt^(17,18,19) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่แพ้ cobalt สำหรับประทาน vitamin B12 ทางปาก ก็จะทำให้เกิด recurrent cheilitis ด้วย

ในประเทศไทย เมื่อผู้ป่วยไม่สนใจเป็นไข้ เป็นหวัด และไปหาแพทย์ มักได้รับการฉีดยา ซึ่งส่วนมากมี vitamin B12 ผสมอยู่ด้วย จึงอาจเป็นสาเหตุให้พบว่าในการทดสอบ patch test มีผู้ป่วยแพ้ cobalt มากถึงอันดับที่ 4

ส่วน wood tar ซึ่งพบมากเป็นลำดับที่ 5 นั้น ประกอบด้วย pine tar, beech tar, juniper tar (oil of Cade) และ birch tar (oleum rusci) พนใน shampoo, ยาดับกிலินด้วย, ยาแก้ไอ, ยาทาผิวน้ำกันแมลง ยารักษาโรคเกี่ยวกับพืช, น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและยาฆ่าแมลง ผู้ป่วยที่แพ้ Wood tar มักจะต้องแพ้ balsam of Peru ด้วย พบรากการแพ้ Wood tar อาจเป็นตัวบ่งบอกถึงการแพ้หัวน้ำหอมในสนน และเครื่องสำอางในประเทศไทย⁽²⁰⁾

อ้างอิง

1. Fisher AA. Regional contact dermatitis and noneczematous contact dermatitis. In : Fisher AA. ed. Contact Dermatitis. 3rd ed. Philadelphia : Lea & Febiger, 1986. 77-118
2. Cronin A. Technique of patch testing. In : Cronin E. ed. Dermatitis. Edinburgh : Churchill Livingstone, 1983. 1-19
3. Adams RM. Patch testing - a recapitulation. J Am Acad Dermatol 1981 Dec; 5(6) : 629-643
4. Hammershoy O. Standard patch test results in 3,225 consecutive Danish patients from 1973 to 1977. Contact Dermatitis 1979 Jun; 6(4) : 263-268
5. Husain SL. Contact dermatitis in the West of Scotland. Contact Dermatitis 1977 Dec; 3(6) : 327-332
6. Larsen W. Perfume dermatitis. In : Fisher AA. ed. Contact Dermatitis. 3rd ed. Philadelphia : Lea & Febiger, 1986. 394-404
7. Eiermann HJ, Larsen W. Maibach WG, Taylor JS. Prospective study of cosmetic reactions; 1977-1980. J Am Acad Dermatol 1982 May; 6(5): 909-917
8. Calnan CD. Nickel sensitivity in women. Arch Allerg Appl Immunol 1957 Jul; 11(1) : 73
9. Fisher AA. Nickel dermatitis. Cutis 1967 Feb; 1(2) : 298

10. Morris GE. Chromate dermatitis from chrome glue and other aspects of the chrome problem. *AMA Arch Industr Health* 1955 May; 11(3) : 368-371
11. Tritsch H, Orfanos C, Luckeath I. Experiments on the allergic skin reaction to chromate catgut. *Hautarzt* 1967; 13 : 355-361
12. Nater JP. Possible causes of chromate eczema. *Dermatologica (Basel)* 1963; 126:160-166
13. Fregert S. Book matches as source of chromate. *Arch Derm (Chicago)* 1963 Nov; 88(11) : 546-547
14. Fregert S. Chromate eczema and matches. *Acta Dermatovener (Stockholm)* 1961; 41:433-442
15. Feuerman EJ. Housewives' eczema and the role of chromates. *Acta Dermatovener (Stockholm)* 1969; 49 : 288 - 293
16. Anderson FE. Cement and oil dermatitis : the part played by chrome sensitivity. *Br J Derm* 1960 Mar; 72(2) : 108 - 117
17. Rostenberg A, Jr. Perkins AJ . Nickel and cobalt dermatitis. *J Allergy* 1951 Sep; 22 : 466 - 474
18. Price ML, MacDonald DM. Cheilitis and cobalt allergy related to ingestion of vitamin B12. *Contact Dermatitis* 1981 Nov; 7(6) : 352
19. Fisher AA. Contact dermatitis and home and abroad. *Cutis* 1972 Nov; 10(5) : 719-723
20. Olholm-Larsen P, Heydenreich G. Allergy to balsam of Peru and wood tars : an increasing problem? *Contact Dermatitis* 1976 Oct; 2 (5) : 293-294